

تأثير الفسيولوجي للرش الورقي باليوريا والهيوميك على النمو الخضري وانتاجية

أشجار الدراق صنف May crest

يحيى يوسف⁽¹⁾* و محمد نظام⁽¹⁾

(1). إدارة بحوث البيستة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، اللاذقية، سورية.

(للمراسلة: د. يحيى يوسف، البريد الإلكتروني: yahya.yosof@gmail.com)

تاریخ القبول: 26/06/2024

تاریخ الاستلام: 17/04/2024

الملخص

نفذ البحث خلال عامي (2022-2023) م على أشجار صنف النكتارين ماي كريست (cv.May crest) المزروعة في بستان في قرية بيت شوفان في طرطوس لتحديد تأثير التراكيز المختلفة لسماد اليوريا والهيوميك والتدخل بينهم ومدى تأثيرهم في تحسين النمو الخضري للأشجار المدروسة؛ إذ وجد أن الرش المشترك بين سmad اليوريا والهيوميك أعطى أعلى تأثير معنوي مقارنة بالرش المنفرد في معظم المؤشرات المدروسة، حيث تفوقت معاملة (سماد اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل) معنويًا على بقية المعاملات من حيث متوسط قطر النموات الحديثة (0.65) مم والسبة المئوية للمادة الجافة في الأوراق (55.22)% والنسبة المئوية للفوسفور (0.32)% والبوتاسيوم (1.85) الكلي في الأوراق وتتفوقت معاملة (سماد اليوريا بتركيز 3 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل) معنويًا من حيث نسبة الكلوروفيل الكلي في الأوراق حيث جاءت (1.39)% كما تفوقت معاملة (سماد اليوريا بتركيز 3 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل) معنويًا من حيث الإنتاج (35.72) كغ/شجرة والإنتاجية (2232.5) كغ/دونم .

الكلمات المفتاحية: النكتارين، الرش الورقي، اليوريا، الهيوميك

المقدمة:

يعد النكتارين شبيه بثمار الخوخ وهو تشكيلة متنوعة من الدراق وتمتاز ثماره بالقشرة الملساء وتدرج ألوان ثماره بين الأحمر، الأصفر والأبيض. بلغت المساحة المزروعة بالدراق على مستوى القطر العربي السوري (6320) هكتاراً بإنتاج قدره (53662) طناً، شغلت محافظة اللاذقية وطرطوس (671) هكتاراً بإنتاج (7978) طناً من إجمالي الإنتاج (المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية، 2020).

تنتمي اللوزيات إلى الفصيلة الوردية وتحت الفصيلة اللوزية *Prunus* (Gudin, 2000) والجنس *Prunoideae* (Benedikova and Giovannini, 2011) الذي يضم أكثر من 400 نوع من الأشجار والشجيرات المزهرة ولبعضها أهمية اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء العالم .

يعود الاسم النباتي لشجرة الدراق (*Prunus persica*) إلى بلاد فارس التي اشتهرت بزراعة هذا النوع من الفاكهة، والتي تتميز ثمارها بطعم مميز وبشكل جذاب للمستهلك. حالياً هو محصول فاكهة رئيسي في كثير من البلدان مثل الصين، اليونان، إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية وقد بلغت تقريباً المساحة المزروعة من الخوخ والنكتارين في الصين حوالي 105 مليون هكتار (Layne and Bassi, 2008)

من أجل تحسين النمو الخضري في النكتاريين يجب القيام برشها بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية اللازمة لنموها، ويعد عنصر التتروجين أحد العناصر الأساسية التي تشجع النمو الخضري للنبات وهو يدخل في تركيب البروتينات، الأنزيمات والأحماض الأمينية (Havlin *et al.*, 2005). ويدخل في تكوين الكلوروفيل الذي يساهم في عملية التمثيل الضوئي وهي عملية ضرورية في نمو النبات (Hopkins, 2006).

يعد سماد اليوريا من أهم أشكال التتروجين الملائمة للرش الورقي لأشجار النكتاريين والدراق، ويعود السبب لقلة سميته وذوبانه العالي وعدم قطبيته وسرعة انتقاله وامتصاصه من الأوراق كما أن محتواه من عنصر التتروجين عالي (حوالي 46%) بالإضافة لذلك فإن تكلفة الرش الورقي بسماد اليوريا منخفضة (الشبيني، 2005).

يعد الرش الورقي بحمض الهيوميك أحد الإتجاهات الحديثة في الزراعة العضوية، وحمض الهيوميك هو أحد الأحماض العضوية التي تنتج بشكل طبيعي وهو من المركبات الدبالية الناتجة عن تحلل المواد العضوية وله تأثير إيجابي على نمو النبات بسبب وصول جزيئاته بسهولة إلى بلازما الخلايا النباتية وتحسينه عمليتي التنفس والتتمثيل الضوئي (Nardi *et al.*, 2002).

بيّنت الدراسات أن حمض الهيوميك يحسن نسبة الكلوروفيل في الأوراق وله دور مساعد في تحسين الإنتاجية ونوعية الثمار، بسبب احتوائه على مجموعة الكربوكسيلاز والفينول وله دور كبير في تحسين النشاط الأنزيمي ضمن الخلايا النباتية ويزيد من نفاذيتها (Hagagg *et al.*, 2013). إذ وجد أن الرش الورقي بحمض الهيوميك يحسن النمو الخضري في أشجار المشمش ويزيد الإنتاجية ويساعد في تحسين النوعية (Shalan, 2014). كما وجد أن الرش الورقي بمركب هيومات البوتاسيوم تركيز 2 مل/ل حسن نسبة الكلوروفيل في أوراق غراس الخوخ (Joody, 2012).

وجد أن التداخل في الرش الورقي لسماد اليوريا مع حمض الهيوميك قد أعطى نتائج إيجابية في تحسين النمو الخضري لأشجار الفاكهة، حيث أن إضافة سmad اليوريا بتركيز 3 غ/ل مع حمض الهيوميك بتركيز 2 غ/ل لغراس اللوز أدى إلى زيادة معنوية ملحوظة في ارتفاع قطر الساق وعدد الأوراق والمساحة الورقية والوزن الجاف والطري كما حسن نسبة الكلوروفيل في الأوراق (بهاء وأخرون، 2010).

نظراً لأهمية معرفة سلوكيّة أشجار النكتارين (ماي كريست) تحت تأثير رش التراكيز المختلفة لسماد اليوريا والهيوميك والتداخل بينهم ومدى تأثيرهم في النمو الخضري والإنتاج والإنتاجية ، فقد هدف البحث إلى:

- 1- مقارنة تأثير مركبات اليوريا والهيوميك والتداخل بين اليوريا والهيوميك (كماءد عضوي) لتحديد أفضل المعاملات التي تحسن صفات النمو الخضري في الأوراق.
- 2- معرفة أهمية التداخل بين اليوريا والهيوميك في تحسين نسبة الكلوروفيل في الأوراق، كون أشجار النكتارين معرضة للاصفار والشحوب بشكل كبير.
- 3- تحديد التركيز الأمثل الذي يحقق هدف البحث من ناحية تحسين النمو الخضري بشكل آمن واقتصادي على المزارع.
- 4- تحديد المعاملات التي تعطي أفضل انتاج على الشجرة وانتاجية بـ كغ/دونم.

مواد البحث وطريقه:

- **موقع الدراسة والمواد المستخدمة وتحليل التربة:**

تم تنفيذ البحث خلال عامي (2022-2023) م في بستان في قرية بيت شوفان في محافظة طرطوس ترتفع عن سطح البحر 150 متر تشير معطيات الجدول (1) إلى أن متوسط درجات الحرارة المسائدة في منطقة الدراسة ملائمة لنمو وإثمار أشجار الدراق كمية الأمطار الهاطلة خلال موسم النمو لعام 2022 كانت قليلة وتحسن في العام 2023.

الجدول (1): يبين المعطيات المناخية (حرارة، أمطار) لمواسم النمو

موسم 2023			موسم 2022			الشهر
حرارة صغرى م°	حرارة عظمى م°	أمطار مم	حرارة صغرى م°	حرارة عظمى م°	أمطار مم	
6.9	12.8	344	7.7	12.3	385.6	كانون الثاني
7.7	14.3	274	9.8	16.4	83	شباط
8	16.5	204.7	12.4	20.5	25.4	آذار
12.2	19.3	137.7	13.2	21.6	41.7	نيسان
15.4	25.9	101	19.3	25.8	79.5	آيار
20.3	27.9	1.3	21.7	27.3	60.5	حزيران
22.1	28.2	2.7	23.8	28.9	0.3	تموز
23.3	30	0.2	24.3	29.2	-	آب
20.6	28	13.1	21.4	27.5	5.4	أيلول
17.1	26.8	58.9	15.9	23.6	54.8	تشرين الأول
12.1	22.1	91.1	12.8	19.3	68	تشرين الثاني
7	14.5	499.2	10.6	14.8	36.13	يناير

- المادة النباتية: أشجار النكتارين (صنف ماي كريست) بعمر ست سنوات مطعمة على أصل الدراق البري وهو صنف قوي النمو، انتاجه عالي ، تظهر المعاومة في الانتاج أحياناً، متوسط وزن الثمرة 108 غرام متوسطة الحجم ملساء لونها أحمر على قاعدة صفراء، اللب أصفر، النضج مبكر جداً في أيار ومزروعة بأبعاد 5 x 5 م في تربة كلسية، إذ كانت الأشجار سليمة متماثلة في النمو والحيوية وطبقت عليها نفس العمليات الزراعية (عزيز وري وتعشيب) في كل الموسمين.

تم استخدام سماد البيرا (46%) والهيميك (مركب نيو هيميك)، ويوضح الجدول (2) مكونات مركب نيو هيميك:

الجدول (2): مكونات مركب نيو هيوميك المستخدم في الدراسة الحالية

التركيز	المكونات
% 65	مادة عضوية
شوابئ	K_2O
شوابئ	N
شوابئ	Fe

تحليل التراث -

أخذت عينات من مواقع مختلفة من تربة الموقع في خريف كل موسم وعلى ثلاثة أعماق من (0-25) و(25-50) و(50-75) وأجريت عليها بعض التحاليل الميكانيكية والكيميائية في مخبر تحليل بيت كمونة التابعة للبحوث العلمية الزراعية في

طرطوس ، ودونت النتائج في الجدول (3) والذي بين أن التربة مائلة للقلوية (pH 7.9-8.2) وغير مالحة اذ بلغ EC بين 0.76 dS/m ، و حسب مثاث القوام كانت التربة طينية رملية القوام.

الجدول (3): خصائص تربة موقع البحث

مع/كغ تربة							التحاليل الكيميائية %			تحليل ميكانيكي %			عجينة مشبعة	عمق العينة/سم
B	Fe	Zn	بوتاسي متبادل K	فوسفور P	آزوت N %	مادة عضوية %	كربونات الكالسيوم CaCO_3	طين	سلت	رمل	dS/m ملليموز/سم	PH		
1.2	1.30	0.38	400	250	5.2	1.0	30	49.25	10.35	41.4	0.98	8	0-25	
1	1.23	0.45	386	200	4.4	0.91	30	40.75	19.1	40.15	0.76	7.9	50-25	
0.2	1.15	0.43	305	140	6	0.82	48	50.75	14.1	35.15	1.04	8.2	75-50	

• طرائق البحث:

أ. معاملات ومواعيد الرش الورقي: تم استخدام المعاملات التالية:

6. يوريا 2 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل.
7. يوريا 3 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل.
8. يوريا 3 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل.
9. شاهد.
1. يوريا 2 غ/ل.
2. يوريا 3 غ/ل.
3. هيوميك 1 غ/ل.
4. هيوميك 2 غ/ل.
5. يوريا 2 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل.

تم تنفيذ 3 رشات ورقية بفواصل زمني 15 يوماً، حيث كان موعد الرشة الأولى في الربيع بعد العقد مباشرة من عامي 2022 و 2023 م.

ب. المؤشرات المدروسة:

أخذت العينات الورقية من أربعة فروع تمثل اتجاهات الشجرة الأربع بمعدل 20 ورقة من أواسط كل فرع، وذلك بعد الانتهاء من الرش الورقي ب 15 يوماً حيث أخذت القياسات الحقلية على النحو التالي:

- طول النموات الحديثة (سم).
- قطر النموات الحديثة (مم).

تم قياس طول وقطر النموات الحديثة لكل فرع من الفروع المختارة مسبقاً بأخذ قراءة أولية عند بداية الرش وقراءة نهائية بعد الرش الأخيرة وطرح القراءتين لمقارنة أطوال وأقطار النموات الحديثة بين المعاملات في كلا الموسمين.

وجمعت العينات الورقية وتم حساب:

- المساحة الورقية (sm^2): تم قياس متوسط المساحة الورقية للأوراق وفق معادلة (Demirsoy *et al.*, 2004)

$$\text{LA} = -0.5 + 0.23 [\text{L}/\text{W}] + 0.67 \text{ LW}$$

حيث أن:

W : عرض الورقة (سم). L : طول الورقة (سم). LA : المساحة الورقية (sm^2).

وأرسلت العينات إلى محطة بحوث الهنادي وتم حساب:

- نسبة المادة الجافة في الأوراق (%): تم غسل الأوراق وزنها بميزان حساس وتم تسجيل الوزن لجميع الأوراق وتم

حساب معدل الوزن الرطب لأوراق كل معاملة، وضعت الأوراق في أكياس ورقية مثقبة وجففت في فرن كهربائي على

درجة حرارة 70 °م حتى ثبات الوزن وبعد ذلك تم وزنها وحساب نسبة المادة الجافة لأوراق كل معاملة:

الوزن الجاف

$$\text{النسبة المئوية للمادة الجافة للأوراق} = \frac{100 \times \text{الوزن الجاف}}{\text{الوزن الرطب}}$$

- نسبة الكلوروفيل الكلي في الأوراق (ملغ/غ وزن رطب): تمأخذ عينة ورقية طرية 0.25 غ من أوراق الأشجار

المأخوذة في نهاية التجربة، إذ تم سحقها في جفنة خزفية باستخدام 10 مل أسيتون وترشيحها بواسطة ورق الترشيح

وتم أخذ 1 مل من الراشح وإكمال الحجم إلى 10 مل باستخدام مادة الأسيتون وبعدها تم قراءة الكثافة الضوئية

للمستخلص بواسطة جهاز Spectrophotometer عند الأطوال الموجية 645 و 663 نانومتر وتقدير الكلوروفيل

الكلي في الأوراق وفق معادلة (Goodwine, 1965):

$$20.2 (\text{A645}) - 8.02 (\text{A663}) \times V / 1000 \times W = \text{الكلوروفيل الكلي}$$

حيث أن:

A = قراءة الجهاز (قراءة الامتصاص الضوئي). V = حجم محلول الاستخلاص (مل). W = وزن العينة (غ).

- نسبة النتروجين (%) ونسبة الفوسفور (%) ونسبة البوتاسيوم (%):

تم غسل العينات الورقية بالماء الجاري في البداية ثم غسلت مرتين بالماء المقطر ثم جففت على درجة حرارة 70 °م حتى ثبات

الوزن وبعدها تم طحنها. تم تقدير العناصر الكبرى في الأوراق باستخدام ميكرو-كلدائل لتقدير نسبة النتروجين المئوية الكلية في

الأوراق وتم تقدير نسبة الفوسفور المئوية الكلية في الأوراق باستخدام الطريقة اللونية الزرقاء الفوسفورية الكروتونية في نظام

السلفوريك وتم استخدام طريقة اللهب لتقدير نسبة البوتاسيوم المئوية الكلية في الأوراق (Jones, 2001).

- تقدير الإنتاج بـ كغ/شجرة والإنتاجية بـ كـغ/دونم

ج. التحليل الإحصائي:

تم استخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة: 27 شجرة: 9 معاملات \times 3 مكررات (كل شجرة مكرر)، وحللت النتائج (متوسط

الموسمين) باستخدام البرنامج الإحصائي (GenStat Release 12.1) باعتماد طريقة تحليل التباين ANOVA ومقارنة

الفرق بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي (LSD) عند مستوى معنوية 5%.

النتائج والمناقشة:

• طول وقطر النموات الحديثة والمساحة الورقية:

تشير النتائج الموضحة في الجدول (4) إلى أن الرش الورقي للهيوميك مع اليوريا بشكل مشترك على صنف النكتارين (ماي

كريست) أعطى أفضل تأثير معنوي على زيادة طول وقطر النموات الحديثة مقارنة بمعاملات الرش المنفرد لهاتين المادتين، حيث

سجلت معاملة اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل أعلى قيمة (45.3 سم و 0.65 مم) على التوالي، تليها معاملة سداد اليوريا

بتركيز 3 غ/ل + الهيوميك 1 غ/ل إذ سجلت (43.53 سم و 0.6 مم) على التوالي، بالمقابل سجلت معاملة الشاهد أدنى قيمة في هذا الصدد (29.36 سم و 0.37 مم) على التوالي. وقد توافقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Eissa وآخرون (2007)؛ إذ وجد أن الهيوميك له تأثير إيجابي على زيادة طول قطر النموات الحديثة في أشجار اللوزيات، ومع ما توصلت إليه دراسة Al-Aareji (2010)؛ إذ وجد أن استخدام مصدر عضوي مع مصدر نتروجيني (بيوريا) يزيد طول قطر النموات في أشجار الدراق، كما وجد الباحثين Jassem وObaid (2010) أن رش أشجار المشمش بمركب هيومات البوتاسيوم بتركيز 1.5 مل/ل أدى لزيادة طول قطر النموات الحديثة. ومع نتائج Kumar et al (2017) التي أظهرت أن التغذية الورقية حسنت معايير النمو وزادت طول النموات قطرها.

تبين القيم المتحصل عليها في الجدول (4) أن معظم المعاملات حسنت بشكل معنوي متوسط المساحة الورقية في صنف النكتارين (ماي كريست) مقارنة بمعاملة الشاهد، ولوحظ أن الرش الورقي بشكل مشترك بين البيوريا والهيوميك أعطى قيم إيجابية أفضل من الرش الورقي لكلتا المادتين بشكل منفرد. إذ أن معاملة سmad البيوريا بتركيز 2 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل سجلت أعلى قيمة (37.9 سم²) تليها معاملة سmad البيوريا بتركيز 2 غ/ل + الهيوميك 1 غ/ل حيث سجلت قيمة (37.56 سم²) بينما سجلت معاملة الشاهد أدنى قيمة (29.26 سم²). وقد توافقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Bahha وآخرون (2009)؛ إذ وجد أن الرش الورقي بالهيوميك 2 غ/ل مع مصدر نتروجيني (بيوريا) أدى لزيادة المساحة الورقية في أشجار اللوز، ويعود السبب إلى أن الهيوميك ينشط عمليات انقسام الخلايا وتكون نموات ورقية جديدة وأن الرش الورقي للمادتين معاً يساهم في تحسين صفات النمو الخضري.

الجدول (4): طول قطر النموات الحديثة والمساحة الورقية

المعاملة	طول قطر النموات الحديثة (سم)	قطر النموات الحديثة (مم)	المساحة الورقية (سم ²)
بيوريا 2 غ/ل	34.03	0.38	32.36 ^{cd}
بيوريا 3 غ/ل	32.23	0.39	32.46 ^{cd}
هيوميك 1 غ/ل	32.86	0.4	33.56 ^{bc}
هيوميك 2 غ/ل	35.26	0.4	32.2 ^{cd}
بيوريا 2 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل	41.66 ^b	0.59 ^b	37.56 ^a
بيوريا 2 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل	45.3 ^a	0.65 ^a	37.9 ^a
بيوريا 3 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل	43.53 ^{ab}	0.6 ^b	35.13 ^{abc}
بيوريا 3 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل	42.86 ^{ab}	0.59 ^b	36.6 ^{ab}
شاهد	29.36 ^d	0.37 ^d	29.26 ^d
LSD 5%	3.2137	0.0154	3.2015

الأحرف المتماثلة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى معنوية 5%

• نسبة المادة الجافة والكلوروفيل الكلي في الأوراق:

تشير النتائج الموضحة في الجدول (5) إلى أن كافة معاملات الرش الورقي سجلت تأثير معنوي بنسبة المادة الجافة في الأوراق مقارنة بمعاملة الشاهد، كما وجد أن الرش المشترك بين سmad البيوريا والهيوميك أعطى أعلى تأثير مقارنة بالرش المنفرد. وقد أعطت معاملة سmad البيوريا بتركيز 2 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل أعلى قيمة (55.22%) تليها معاملة سmad البيوريا بتركيز 3 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل (52.14%). بينما سجلت معاملة الشاهد أقل قيمة (34.82%) مقارنة ببقية معاملات التجربة. وقد توافقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Nardi وآخرون (2002)؛ إذ وجد أن الهيوميك يلعب دور مشابه للأوكسينات في زيادة انقسام

الخلايا وزيادة نسبة المادة الجافة في الأوراق وبالتالي تحسين النمو الخضري، ومع ما توصلت إليه دراسة Bahha وآخرون (2009)؛ إذ وجد أن الرش الورقي لليوريا والهبيوميك بشكل مشترك يحسن من نسبة المادة الجافة في الأوراق، كما وجد Amujoyegbe وآخرون (2007) أن زيادة المساحة الورقية ونسبة الكلوروفيل في الأوراق يزيد من التمثيل الكربوني والمواد المصنعة من الكربوهيدرات المتراكمة في النبات والبروتينات وبالتالي زيادة في نسبة المادة الجافة في الأوراق كما اتفقت مع نتائج Bhoyar (2016) التي أظهرت أن التغذية الورقية حسنت نسبة كل من الكلوروفيل a و b ونسبة المادة الجافة.

تبين القيم المتحصل عليها في الجدول (5) أنه يوجد تأثير معنوي لمعاملة الرش الورقي المشترك بين سدام اليوريا والهبيوميك في تحسين نسبة الكلوروفيل في الأوراق مقارنة بالرش الورقي المنفرد ومعاملة الشاهد. وقد سجلت معاملة سدام اليوريا بتركيز 3 غ/ل + الهبيوميك 2 غ/ل أعلى قيمة (1.39) ملغ/غ وزن رطب. ولقد وجد نفس التأثير لمعاملتي (سدام اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهبيوميك 1 غ/ل وسدام اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهبيوميك 2 غ/ل) إذ سجلتا نفس القيمة (1.14) ملغ/غ وزن رطب. بينما سجلت معاملتي الشاهد وسدام اليوريا بتركيز 2 غ/ل أقل قيمة (1) ملغ/غ وزن رطب مقارنة ببقية معاملات التجربة. وقد توافقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Havlin وآخرون (2005)؛ إذ وجدوا أن التأثير الإيجابي لكل من اليوريا والهبيوميك معاً، ويعود السبب إلى أن النتروجين يلعب دوراً أساسياً في بناء صبغة الكلوروفيل في الأوراق لدوره في تركيب وحدات Porphyrins الدالة في تركيب صبغة الكلوروفيل. كما وجد Chen وآخرون (2004) أن الهبيوميك يساهم في تحسين نسبة صبغة الكلوروفيل وتجمع الأحماض الأمينية والسكريات والأنيزمات وبالتالي تحسين صفات النمو الخضري في الأشجار.

الجدول (5): نسبة المادة الجافة والكلوروفيل الكلي في الأوراق

المعاملة	المادة الجافة (%)	الكلوروفيل الكلي (ملغ/غ وزن رطب)
بوريا 2 غ/ل	٤١.٦٨	^d 1
بوريا 3 غ/ل	٤٢	^d 1.01
هبيوميك ١ غ/ل	٤٦.٥١	^d 1.01
هبيوميك ٢ غ/ل	٤٧.٧٩	^c 1.03
بوريا ٢ غ/ل + هبيوميك ١ غ/ل	٤٨.٧٨	^b 1.14
بوريا ٢ غ/ل + هبيوميك ٢ غ/ل	٥٥.٢٢	^b 1.14
بوريا ٣ غ/ل + هبيوميك ١ غ/ل	٤٩.٨٩	^b 1.13
بوريا ٣ غ/ل + هبيوميك ٢ غ/ل	٥٢.١٤	^a 1.39
شاهد	٣٤.٨٢	^d 1
LSD 5%	3.9139	0.0173

الأحرف المتماثلة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى معنوية 5%

• نسبة النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الكلية في الأوراق:

تشير النتائج الموضحة في الجدول (6) إلى أن كافة معاملات الرش الورقي سجلت تأثير معنوي في زيادة نسبة العناصر الكبرى (N-P-K) مقارنة بمعاملة الشاهد، كما لوحظ أن الرش الورقي المشترك أعطى أفضل نتائج أفضل مقارنة بالرش المنفرد، وأن أفضل المعاملات التي حسنت نسبة النتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم كانت معاملة سدام اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهبيوميك 2 غ/ل إذ سجلت (3.33، 0.32، 0.32%) للنتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم على التوالي، تليها معاملة سدام اليوريا بتركيز 3 غ/ل + الهبيوميك 2 غ/ل إذ سجلت (3.3، 0.3، 0.3%) للنتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم على التوالي، بينما سجلت معاملة الشاهد أقل

القيم مقارنة ببقية المعاملات (2.06، 0.09، 0.6 %) للنتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم على التوالي. وقد توافت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة علي (1987) الذي وجد أن التأثير المشترك بين اليوريا والهبيوميك أدى إلى زيادة امتصاص اليوريا في الأوراق مما انعكس بشكل إيجابي على نسبة النتروجين في الأوراق، كما وجد Dong وآخرون (2002) أن الرش الورقي بالليوريا قد يزيد من كمية الطاقة المجهزة للجذور (ATP) والتي تجعل من النظام الجذري أكثر كفاءة وقدرة على امتصاص عنصر النتروجين من التربة في وقت متاخر من الموسم. ووجد Pascual وآخرون (1999) أن الرش الورقي بالهبيوميك يزيد من نفاذية الأغشية ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية كالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. كما وجد Joody (2013) أن الرش الورقي بالهبيوميك يزيد من نسبة الفوسفور في الأوراق لأن المركب يحتوي على مواد عضوية وعناصر غذائية تنشط النمو الخضري في أوراق أشجار الخوخ كما تتفق النتائج مع yosof وآخرون (2020) الذي بين أثر التغذية الورقية في تحسين نسبة العناصر الكبرى (N-P-K).

الجدول (6): نسبة النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الكلية في الأوراق

المعاملة	النتروجين (%)	الفوسفور (%)	البوتاسيوم (%)
يوريا 2 غ/ل	٢.١٦	٠.١٣	٠.٩٣ ^f
يوريا ٣ غ/ل	٢.١٥	٠.١٥ ^d	١.١٧ ^e
هبيوميك ١ غ/ل	٢.٢١ ^c	٠.١٤ ^d	٠.٩٦ ^f
هبيوميك ٢ غ/ل	٢.١٧ ^{cd}	٠.٢ ^c	١.٢٦ ^d
يوريا ٢ غ/ل + هبيوميك ١ غ/ل	٢.٦٥ ^b	٠.٢١ ^c	١.٦٧ ^c
يوريا ٢ غ/ل + هبيوميك ٢ غ/ل	٣.٣٣ ^a	٠.٣٢ ^a	١.٨٥ ^a
يوريا ٣ غ/ل + هبيوميك ١ غ/ل	٣.٣١ ^a	٠.٢٦ ^b	١.٧٦ ^b
يوريا ٣ غ/ل + هبيوميك ٢ غ/ل	٣.٣ ^a	٠.٣ ^{ab}	١.٧٨ ^b
شاهد	٢.٠٦ ^e	٠.٠٩ ^e	٠.٦ ^g
LSD 5%	0.0494	0.0391	0.0708

الأحرف المتماثلة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى معنوية 5%

• تقدير الإنتاج والانتاجية:

تشير النتائج الموضحة في الجدول (7) إلى أن كافة معاملات الرش الورقي سجلت تأثيراً معنويّ في زيادة الإنتاج والانتاجية مقارنة بمعاملة الشاهد، كما لوحظ أن الرش الورقي المشترك أعطى نتائج أفضل مقارنة بالرش المنفرد، وأن أفضل المعاملات التي حسنت الإنتاج والانتاجية هي معاملة (يوريا 3 غ/ل + هبيوميك 2 غ/ل) إذ سجلت إنتاجية (2232.5) كغ/دونم ومعاملة (يوريا 2 غ/ل + هبيوميك 2 غ/ل) إذ سجلت إنتاجية (2254.37) كغ/دونم حيث تفوقت هاتان المعاملتان معنويّاً على كافة المعاملات الباقية بينما سجلت معاملة الشاهد أقل قيمة (659.37) كغ/دونم . وقد توافت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Bahha وآخرون (2009)؛ إذ وجد أن الرش الورقي للليوريا والهبيوميك بشكل مشترك يحسن من الإنتاج والانتاجية في وحدة المساحة.

الاستنتاجات:

- تفوق الرش المشترك بين سداد اليوريا والهبيوميك معنويّاً مقارنة بالرش المنفرد في معظم المؤشرات المدروسة.
- تفوق معاملة سداد اليوريا بتركيز 2 غ/ل + الهبيوميك 2 غ/ل معنويّاً على بقية المعاملات من حيث متوسط قطر النموات الحديثة والنسبة المئوية للمادة الجافة في الأوراق والنسبة المئوية للفوسفور والبوتاسيوم الكلية في الأوراق.

- تفوق معاملة سmad اليوريا بتركيز 3 غ/ل + الهيوميك 2 غ/ل معمونياً من حيث نسبة الكلورو فيل الكلي في الأوراق.
- تفوق معاملتي سmad يوريا 2 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل و يوريا 3 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل معمونياً من حيث الإنتاج والانتاجية

الجدول (7): تقدير متوسط الإنتاج والانتاجية

المعاملة	متوسط الإنتاج كغ/شجرة	متوسط الإنتاج كغ/دونم
يوريا 2 غ/ل	19.375 ^f	1210.93 ^f
يوريا 3 غ/ل	24.9 ^e	1556.25 ^e
هيوميك 1 غ/ل	29.46 ^{cd}	1841.25 ^{cd}
هيوميك 2 غ/ل	27.55 ^{de}	1721.87 ^{de}
يوريا 2 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل	31.82 ^{bc}	1989.06 ^{bc}
يوريا 2 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل	36.07 ^a	2254.37 ^a
يوريا 3 غ/ل + هيوميك 1 غ/ل	31.91 ^b	1994.37 ^b
يوريا 3 غ/ل + هيوميك 2 غ/ل	35.72 ^a	2232.5 ^a
شاهد	10.55 ^g	659.37 ^g
LSD 5%	2.86	178.67

الأحرف المتماثلة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معمونية بينها عند مستوى معمونية 5%

المراجع:

الشيني، جمال محمد (2005). برامج تسميد حدائق الفاكهة. المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية.
صفحة. 318

المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية. مساحة وإنتاج وعدد أشجار الدراق حسب المحافظات. مديرية الإحصاء الزراعي، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، دمشق، سوريا، 2020.

بهاء، عامر عبد العزيز وعمار فخري خضر وأكرم شاكر محمود (2010). تأثير إضافة السماد النتروجيني (اليوريا) وحامض الهيوميك على نمو شتلات اللوز (*Prunus Amygdalus* (Batsch). مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، 2 (10): 75-69.

يوسف، يحيى وعلي ديب وفهد صهيبوني (2020). تأثير الرش الورقي بعنصر الحديد وبعض مضادات الأكسدة في نمو وإنتاج أشجار الدراق May crest.

Al-Aareji, J. M. A. (2010). Effect of organic fertilizers, urea and sulphur on vegetative growth and concentration of some nutrient of young peach trees CV Dixired. Tekreet Univ. Sci. Agri. 10(2): 76-86.

Amujoyegbe, B. J.; J. T. Opabode and A. Otayinka (2007). Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and chlorophyll content of mays and sorghum *Sorghum bicolor* (L) moench. Afr. J. Biotchno. 6(16): 1869-1873.

Bahha, A. A.; A. Khader and A. Mahmood (2009). Effect of addition nitrogen fertilizers (Urea) and humic acid on growth almond seedling *Prunus amygdalus* (Batsch) in nursery. Tekreet Univ. Sci. Agri. 9(1): 524-534.

- Benedikova, D. and D. Giovannini (2011). Review on Genetic Resources in the ECPGR *Prunus* Working Group. Second Balkan Symposium on Fruit Growing (II BSFG), ISHS, September 5-7, Pitesti - Romania (in press).
- Bhoyer, A. N. J. (2016). Plant growth substances in Horticulture Der Mecanismuc der Zellstreckung. Rec. Trav. Bolt. Neeland 28: 113-244 (C. F. W. H. Freeman and Company Sanfrancisco).
- Chen, Y.; M. Nobili and T. Aviad (2004). Stimulatory Effect of humic substances on plant growth. In: Mogdof., Ray. R. (eds): Soil organic matter in sustainable agriculture. CRC press, Washington.
- Demirsoy, H.; L. Demirsoy; S. Uzun and; B. Ersoy (2004). Non-destructive leaf area estimation in Peach. Europe. J. Hort. Sci. 69 (4): 144-146.
- Dong. S.; C. F. Chen and L. H. Fuchigami (2002). Nitrogen absorption translocation and distribution from urea applied in autumn to leaves of young potted apple (*Malus domestica*) trees, Tree physiol. 22: 1305-1310.
- Eissa, F. M.; M. A. Fathi and S. A. El-Shall (2007). Response of peach and Apricot seedling to humic acid treatment under salinity condition. J. Agric. Sci. Mansoura Univ. 3605-3620.
- Goodwine, T. W (1965). Quantitative analysis of the chloroplast pigment. Academic Press, London and New York.
- Gudin, S. N (2000). Rose, Genetics and breeding. Plant Breeding. 17: 159-189.
- Hagagg, L. F.; M. F. M. Shahin; M. Afifi; H. A. Mahdy and E. S. El-Hady (2013). Effect of spraying humic acid during fruit set stage on fruit quality and quantity of Picual olive trees grown under Sinai condition. J. A. Sci. Res. 9(3): 1484-1489.
- Havlin, J. L.; J. D. Beaton; S. L. Tisdale and W. L. Nelson (2005). Soil fertility and fertilizers. 7th edn. Upper Saddle River. New Jersey.
- Hopkins, W. G (2006). Plant nutrition. 132 West 31 st Street. New York NY10001.USA.
- Jassem, N. A. and E. A. Obaid (2010). Effect of K-humate and culture on some vegetative growth of apricot (CV). Labeeb, Diala. J. 42: 12-24.
- Jones, J. B. Jr (2001). Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant analysis. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington. D C.
- Joody, A. T. (2012). Effect of humic acid and stress relief on sum characteristics of Japanese plum seedling (*Prunus salicina* L.) exposed to water stress. Euph. J. Agric .Sci. 4(4): 43-51.
- Joody, A. T. (2013). Effect of GA3 and methanol applicaton of humic acid on some vegetative characteristics of plum (*Prunus Salicina*). J. Univ. Tekreet. Agri. Bio. 13(1): 198-204.
- Kumar, N.C.J.;Rajangam, J., Balakrishnan, K.and Lokesh Bora.(2017). Influence of Foliar Fertilization of Micronutrients on Leaf Micro Nutrient Status of Mandarin Orange (*Citrus reticulate*. Blanco.) in Lower Pulney Hills Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 6(5): 516-522.
- Layne, D. R. and D. Bassi (2008). The peach: Botany, Production and uses CAB International.
- Nardi, S.; D. Pizzeghello; A. Muscolo and A. P. Vianello (2002). Effects of humic substances in plant growth. Soil Biol. and Biochem. 34(11): 1527-1536.
- Pascual, J.; A. G. Carola and T. Hevhad (1999). Comparison of frech and composted organic waste in their efficiency for the improvement of arid soil quality. Bioresources. Technol. 68: 255-264.

Shalan, A. M. (2014). Effect of bio-stimulant and soil amendment on vegetative growth, yield and fruit quality of *Pyrus communis* cv. 'Le conte' pear trees. J Plant Production, Mansoura Univ. 5(12): 1973-1987.

The physiological effect of foliar spray with urea and humic on vegetative growth and productivity of peach trees. cv.May crest

Yahya Yosof⁽¹⁾ * and Mohammad Nizam⁽¹⁾

(1). Researcher, Administration of Horticulture Research, General Commission for Scientific Agricultural Research, Lattakia, Syria.

(*Corresponding author: Yahya Yosof , Email: yahya.yosof@gmail.com).

Received: 17/04/2024 Accepted: 26/06/2024

Abstract

The experiment was conducted during two years (2023–2022) on Nectarine trees (May crest cv.) in beet shofan-tartous-to study the impact of different concentrations of urea and humic foliar spray and their interaction on the improvement of vegetative growth. It was found that the combined application of urea fertilizer and humus gave the highest significant effect compared to the individual application in most of the indicators studied, as the treatment (urea fertilizer at a concentration of 2 g/l + Humic 2 g/l) was superior to the rest of the treatments in terms of the average diameter of modern plants (0.65 mm, the percentage of dry matter in the leaves (55.22%), the percentage of phosphorus (0.32)%, and the percentage of potassium (1.85)% alcohol in the leaves, and the treatment (urea fertilizer at a concentration of 3 g/L + Humic 2 g/L) was significantly superior in terms and of the percentage of alcohol chlorophyll and in Leaves: The yield reached (1.39)% from the (urea fertilizer) treatment at a concentration of 3 g/l + Humic 2 g/l in terms of productivity (35.72) kg/tree and yield (2232.5) kg/dunum.

Keywords: Nectarine, Foliar spray, Urea, Humic