

دراسة السلوك الوراثي لبعض الصفات الفينولوجية لهجن من البازلاء العلفية

حنين القصير^{1*} ومحمد جمال حمندوش¹ وأحمد شمس الدين شعبان¹ وعبد الله اليوسف²¹ قسم المحاصيل الحقلية، كلية الهندسة الزراعية، جامعة حلب، حلب، سورية.² مركز بحوث حلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية.(* للمراسلة: حنين القصير، البريد الإلكتروني haninalkaseer92@gmail.com الهاتف: 0941818755)

تاريخ القبول: 2026/ 08/2

تاريخ الاستلام: 2026 /01 /23

الملخص

أُجريت الدراسة خلال مواسم 2020-2024 في محطتي حميمة (حلب) والكريم (سلمية) التابعتين للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وفي موقعين: بعلي ومروي. استُخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاثة مكررات لتقييم قوة الهجين والقدرة العامة والخاصة على التوافق للصفات الفينولوجية في البازلاء العلفية، وشملت سبع سلالات أبوية و21 هجيناً ناتجاً عن تهجين نصف تبادلي. في الموقع البعلي: كان الهجين $G4 \times G7$ الأكثر تكبيراً (85.5 يوماً)، وأظهر الهجينان $G2 \times G3$ و $G2 \times G5$ قوة هجين سالبة لصفة عدد الأيام حتى الإزهار اعتماداً على الأب الأفضل، وتميز الأب $G3$ بقدرة عامة مرتفعة على التوافق للتبكير في الإزهار، بينما سجل الهجين $G6 \times G7$ قدرة خاصة عالية. بالنسبة لصفة عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي، كان الهجين $G3 \times G4$ الأكثر تكبيراً في النضج (111.5 يوماً) وأظهر قوة هجين سالبة معنوية، وتميز الأب $G1$ بقدرة عامة عالية على التوافق، كما أظهر الهجينان $G1 \times G5$ و $G3 \times G5$ قدرة خاصة مرتفعة مع توقع ثبات الصفة في الأجيال اللاحقة. في الموقع المروي: كان الهجين $G1 \times G4$ الأكثر تكبيراً (88.5 يوماً) وهو فقط الذي سجل قيمة سالبة لقوة الهجين لصفة عدد الأيام حتى الإزهار، وتميز الأب $G1$ بقدرة عامة عالية دون هجن واحدة. وبالنسبة لصفة عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي، كانت الهجن الثلاثة $G1 \times G3$ و $G1 \times G5$ و $G6 \times G2$ الأكثر تكبيراً (116 يوماً)، كما أظهر الهجين $G1 \times G3$ قوة هجين معتمدة على الأب الأفضل ومتوسط الأبوين، والهجين $G2 \times G6$ على متوسط الأبوين فقط، كما امتلك الأب $G1$ قدرة عامة عالية على التوافق، وأظهر الهجين $G1 \times G6$ قدرة خاصة مرتفعة مع توقع استقرار الصفة في الأجيال القادمة.

الكلمات المفتاحية: قوة الهجين، القدرة العامة على التوافق، القدرة الخاصة على التوافق، طرز وراثية، الهجين، البازلاء العلفية.

المقدمة:

تُشكّل محاصيل الأعلاف حجر الأساس للزراعة المستدامة، إذ تُعرّف بأنها الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات - باستثناء الحبوب - والتي تُستخدم لتغذية الحيوانات. وتؤدي هذه المحاصيل دوراً محورياً في تغذية ماشية اللحم والحليب، إلى جانب تعزيز تنوع المحاصيل، ودعم موائل الحياة البرية، وتحسين النظم البيئية للتربة. كما تمثل محاصيل الأعلاف أداة إنتاجية مهمة للمزارعين، إذ يتطلب نجاح زراعتها اختيار النوع المناسب وإدارة دقيقة للمحصول لضمان الاستفادة منه في مراحل النمو الأكثر إنتاجية، فضلاً عن الاهتمام بإدارة الآفات والأمراض للحد من تأثيرها في الإنتاجية. (www.bighaat.com)

تُزرع البازلاء العلفية (*Lathyrus sativus* L.)، المعروفة محلياً باسم "الجلبان"، في بلدان جنوب آسيا عادةً لأغراض الحبوب والأعلاف. غير أن المحصول اكتسب أهمية أكبر كمادة علفية للحيوانات أكثر من استخدامه كغذاء بشري، حيث يتكون العلف الحيواني عادةً من الحبوب المطحونة أو الدقيق، ويُستخدم في المقام الأول لتغذية الماشية (Campbell, 1997; Khawaja et al., 1993).

وقد أصبحت البازلاء العلفية تحظى بأهمية متزايدة في النظم الزراعية، ومن المتوقع أن تتوسع مساحات زراعتها في المستقبل (Dejene and Lijalem, 2012) ويُعزى ذلك إلى قدرتها الفائقة على التكيف مع الظروف البيئية غير الملائمة، ولا سيما الإجهادات المائية (Polignano et al., 2005; Vaz Patto et al., 2006)، مما يجعلها محصولاً واعداً للتكيف مع تغير المناخ، وتنوع نظم الزراعة، والتوسع في الزراعة المستدامة (Vaz Patto et al., 2006; Hillocks and Maruthi, 2012). تُقدّر المساحة العالمية المزروعة بالبازلاء العلفية حالياً بنحو 700,000 هكتار، استناداً إلى أحدث التقديرات الصادرة عن Kumar, et al., (2021)، وتشير تقديرات أخرى إلى مساحة أوسع تبلغ نحو 1.5 مليون هكتار (Vaz Patto and Rubiales, 2014)، وتتركز مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب آسيا (الهند، باكستان، بنغلادش، نيبال) وشرق إفريقيا (إثيوبيا، السودان). وفي تركيا، بلغت المساحة المزروعة 8,210 هكتار عام 2025، بانخفاض عن 10,000 هكتار عام 2024 و13,351 هكتار عام 2023، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها التاريخية عند 186,000 هكتار عام 2005 (المعهد الإحصائي التركي، 2026).

وتتميز البازلاء العلفية بتأثيرات إيجابية في بنية التربة، إذ تسهم جذورها المتعمقة في الحفاظ على القوام المثالي للتربة، ومنع تراسها، وتحسين تهويتها. كما تُعدّ من الأسمدة الخضراء الجيدة التي تمد التربة بالعناصر المعدنية والمادة العضوية (Lazanyi, 2000) وتتمتع أنواع *Lathyrus* بإمكانيات كبيرة في نظم تعاقب المحاصيل، إذ تحسن الظروف الفيزيائية للتربة، وتُقلل من انتشار الأمراض والأعشاب الضارة، وتُخفض تكاليف الإنتاج عموماً، مما يجعل البازلاء العلفية محصولاً واعداً ونموذجياً للزراعة المستدامة.

على الرغم من التقدم الملحوظ في المعلومات الجينومية المتاحة لجنس *Lathyrus* في السنوات الأخيرة، فإن هذه الموارد لا تزال متواضعة مقارنة بالمحاصيل البقولية الأخرى مثل البازلاء (*Pisum sativum*). وقد طُبقت العديد من تقانات البصمة الوراثية بنجاح في دراسات التنوع الوراثي للجنس، غير أن هذه النجاحات لم تُترجم بعد إلى اكتشاف جينات أو تطوير مؤشرات جزيئية للانتخاب في برامج تربية وتحسين *Lathyrus*.

وفي الآونة الأخيرة، تجدد الاهتمام بزراعة البازلاء العلفية نتيجة للحاجة إلى توسيع تأمين الإنتاج الغذائي باستثمار الأراضي الهامشية، وتوفير بدائل فعالة للقمح في المناطق التي تعاني فيها زراعة الحبوب من الإجهادات البيئية. ويُعدّ الإجهاد المائي من أهم العوامل المحددة للإنتاجية، إذ يؤدي تطبيق نقص المياه في مرحلة الإزهار إلى تقليل عدد القرون لكل نبات عبر تقصير فترة الإزهار ومدة النمو الثمري، إضافة إلى إضعاف خصوبة بعض الأزهار وتساقطها (Nasri et al., 2008).

تشير المراجع العلمية إلى وجود تباين كبير في صفات ارتفاع النبات، وعدد الأيام حتى 50% إزهار، وعدد القرون/نبات، وعدد الأيام حتى النضج، وغلة البذور/نبات، والكتلة الحيوية، وغلة البذور/هكتار لدى معظم الطرز الوراثية للبازلاء العلفية، مما يشير إلى إمكانية تحسين هذه الصفات من خلال الانتخاب والتجهين (Parihar et al., 2015; Ahmadi et al., 2015; Dikshit et al., 2014; Rahman et al., 2010; Wuletaw and Endashaw, 2002, 2003).

وقد أشارت دراسات متعددة إلى وجود تنوع وراثي بين مدخلات البازلاء العلفية وإمكانية تحسين الصفات من خلال الانتخاب المركز، مع تسجيل اختلافات معنوية عالية في صفات مثل عدد الأيام حتى الإزهار وعدد الأيام حتى النضج (Wuletaw and

Endashaw, 2002, 2003; Parihar *et al.*, 2015; Turk *et al.*, 2007; Talukdar and Biswas, 2008; Grela *et al.*, 2010).

وبشكل عام، تُعد المعرفة الشاملة بالتباين الوراثي ودرجة التوريث والتحسين الوراثي المتوقع من الأدوات الأساسية التي تمكن علماء الوراثة والمربين من وضع برامج تربية مناسبة لتحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها (Johnson *et al.*, 1955)، إذ تشكل درجة التوريث والتحسين الوراثي مؤشرات انتخاب رئيسية تساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل (Singh and Narayanan, 1997).

مبررات البحث:

نظراً للظروف التي تمر بها لتغير المناخ في سورية بشكل عام، وزيادة وتيرة تكرار ظاهرة الجفاف وطول مدتها عبر السنوات، وترافق ذلك مع قلة المصادر الوراثية وتأثيرها السلبي على برامج التربية، تتأني أهمية دراسة التحليل الوراثي لسلالات البازلاء العلفية مما يساعد في رفد برامج التهجين بمادة وراثية جديدة محسنة وذات إنتاجية عالية. ومن هنا تأتي أهمية البحث لتحقيق الأهداف التالية:

1. تحديد السلوكية الوراثية للصفات المدروسة عن طريق تقدير مكونات التباين الوراثي وقوة الهجين والقدرة العامة والخاصة على التوافق ودرجة التوريث.

2. انتخاب أفضل الطرز الوراثية الهجينة والمبكرة.

مواد وطرائق البحث:

1. المادة النباتية:

تم استخدام 7 سلالات من البازلاء العلفية (Grass pea) والتي أثبتت كفاءتها الإنتاجية في بحث الماجستير للقصير (2019)، وتم ترميزها من G1 حتى G7 كما هو موضح بالجدول (1) حسب إيكاردا (المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة)

الجدول (1): رموز الطرز الوراثية من البازلاء العلفية المستخدمة

رمز الطراز	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Origin	NPL		BGD	NPL	BGD	BGD	BGD

2. موقع البحث:

تمت زراعة التجربة في محطة بحوث حميمه التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية في حلب لموسم 2020 - 2021، وفي محطة بحوث الكريم في سلمية التابع لمركز البحوث العلمية الزراعية في حماه لمواسم 2021-2022 و 2022-2023 و 2023-2024.

3. خطوات العمل:

1. الموسم الأول 2020 - 2021 في محطة بحوث حميمه:

• تحضير الأرض:

أُستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، وتم تخطيط الأرض لثلاثة مكررات وتقسيمها إلى قطع تجريبية. تألفت كل قطعة تجريبية من 4 خطوط بطول 4 م، وعرض 30 سم، أي بمساحة 4.8 م². زُرِع في كل قطعة تجريبية 200/ بذرة يدوياً في الموعد المناسب بعمق 3-5 سم. وحُرثت الأرض في نهاية شهر تشرين الثاني، وزُرعت المكررات الثلاثة على ثلاثة مواعيد: الموعد الأول 13/12/2020 والموعد الثاني 23/12/2020 والموعد الثالث 06/01/2021.

• العمليات الزراعية:

التعشيب: تم إجراء تعشيب يدوي مرتين منذ بداية الانبات حتى بداية الازهار.
الري: تم إعطاء رية إنبات أولى بتاريخ 07/01/2021، وريّة تكميلية أولى بتاريخ 11/04/2021، ثم رية تكميلية ثانية

20/04/2021

• **التهجين:**

أجريت عملية التهجين وفق برنامج تهجين نصف تبادلي، تم خصي الأزهار في مرحلة التبرعم، وذلك عندما أخذت البراعم حجمها النهائي وقبل تلون التويجات بألوانها الحقيقية. أستخدم الملقط لإبعاد الزورق، حيث نباعد بين الأوراق التوجيهية ونستأصل الأسدية العشرة ثم يعاد الزورق إلى حالته الأولى. تُرك على النبات الواحد من 3-2 أزهار بحيث، يكون على كل عقدة زهرة واحدة وتم إزالة الأزهار الباقية. جُمعت حبوب اللقاح في وعاء صغير وأخذت كمية منها بواسطة الملقط ونُثرت فوق الأزهار المخصصة، وتم عزل الأزهار الملقحة بأكياس ورقية خاصة، وضع عليها بطاقة كُتب عليها اسم الأب واسم الأم وتاريخ التهجين، وفي نهاية الموسم تم حصاد النباتات للحصول على البذار الهجين.

الجدول (2): المخطط العام لجدول التهجين نصف التبادلي

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
G1		X	X	X	X	X	X
G2			X	X	X	X	X
G3				X	X	X	X
G4					X	X	X
G5						X	X
G6							X
G7							

• **الحصاد:**

تم حصاد الآباء والهجن الناتجة عند اصفرار أكثر من 50 % من النباتات بتاريخ 07/06/2021.

2. **الموسم الثاني 2021 - 2022 في محطة بحوث الكريم في سلمية:**• **تحضير الأرض:**

تمت الزراعة على ثلاثة مواعيد، وبنفس التصميم المذكور سابقاً:

الموعد الأول 21/12/2021، والموعد الثاني 29/12/2021، والموعد الثالث 04/01/2022

• **العمليات الزراعية:**

التسميد: تم إضافة السماد الفوسفاتي عند الزراعة.

التعشيب: تم إجراء تعشيب يدوي مرتين منذ بداية الانبات حتى بداية الأزهار.

الري: تم إعطاء رية إنبات أولى بتاريخ 09/01/2022، وريّة تكميلية أولى بتاريخ 12/04/2022، ثم رية تكميلية ثانية

20/04/2021

• **التهجين:**

أجريت عملية التهجين وفق برنامج تهجين نصف تبادلي.

• **الحصاد:**

تم حصاد الآباء والهجن الناتجة عند اصفرار أكثر من 50 % من النباتات بتاريخ 20/05/2022.

3. **الموسم الثالث 2022 - 2023 في محطة بحوث الكريم في سلمية:**• **تحضير الأرض:**

تمت الزراعة على ثلاثة مواعيد، وبنفس التصميم المذكور سابقاً:

الموعد الأول 28/11/2022 والموعد الثاني 05/12/2022 والموعد الثالث 12/12/2022.

• العمليات الزراعية:

التعشيب: تم إجراء تعشيب يدوي مرتين منذ بداية الانبات حتى بداية الازهار.

الري: تم إعطاء رية إنبات أولى بتاريخ 04/12/2022، ورية ثانية بتاريخ 12/12/2022.

رش المبيدات: تم الرش بتاريخ 01/03/2023.

• التهجين:

أجريت عملية التهجين وفق برنامج تهجين نصف تبادلي.

• الحصاد:

تم حصاد الآباء والهجن الناتجة عند اصفرار أكثر من 50 % من النباتات بتاريخ 09/05/2023.

4. الموسم الرابع 2023 - 2024 في محطة بحوث الكريم في سلمية:

• تحضير الأرض:

تم زراعة الآباء والهجن الناتجة من التهجينات السابقة في موقعين أحدهما مروي والآخر بعلي وفق التصميم المذكور سابقاً:

موعد زراعة الموقع المروي 03/01/2024 وموعد زراعة الموقع البعلي 08/01/2024.

• العمليات الزراعية:

التعشيب: تم إجراء تعشيب يدوي في نهاية شهر آذار.

الري: تم إعطاء رية إنبات أولى بتاريخ 10/01/2024 لكلا التجريبتين، وري الموقع المروي 04/04/2024، ورية ثانية للموقع المروي

24/04/2024.

رش المبيدات: تم الرش بتاريخ 01/03/2024، ومرة ثانية مبيدات وأسمدة ذوابة بتاريخ 20/04/2024.

• الصفات المدروسة:

عدد الأيام حتى الازهار: عند إزهار 50% من النباتات في القطعة التجريبية.

عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي: عند اصفرار 50% من النباتات في القطعة التجريبية.

• الحصاد:

تم حصاد الآباء والهجن الناتجة عند اصفرار أكثر من 50 % من النباتات بتاريخ 06/05/2024 للموقع المروي وبتاريخ

07/05/2024 للموقع البعلي.

التحليل الإحصائي:

تم تحليل النتائج باستخدام برنامج **Genstat v12.0** لتحليل التباين إلى مصادره وتقدير المتوسطات للسلاطات المدروسة وتحديد

معنوية القيم للصفات المدروسة على مستوى معنوية (5%).

وتم تقدير التباين الوراثي والتباين الكلي بهدف حساب معامل التوريث بالمفهوم الواسع لكل صفة من الصفات المدروسة.

الجدول (3): نموذج تحليل التباين ومتوسطات المربعات الانحراف المتفوقة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

SV	DF	SS	MS	EMS
----	----	----	----	-----

Replication	N-1	SS1	MS1	
Genotypes	P-1	SS2	MS2	$Q^2e + N Q^2g$
Error	(N-1)(P-1)	SS3	MS3	Q^2e
Total	$Np-1$	SS4	MS4	

حيث: Q^2e التباين العائد للخطأ التجريبي Q^2g التباين الوراثي N عدد المكررات P عدد الطرز الوراثية

التحليل الوراثي:

1. التحليل نصف التبادلي *Half Diallel Analysis*:

تم تجهيز جدول التهجين نصف التبادلي لكل صفة من الصفات المدروسة وذلك لمتابعة دراسة تحليل القدرة على التوافق.

2. تحليل القدرة العامة على التوافق:

تم استخدام الطريقة الثانية (هجن الجيل الأول + الآباء) والموديل الرياضي الأول المقترح من قبل (Griffing, 1956) لدراسة تحليل التباين للقدرة على التوافق. يعتمد تحليل التباين للقدرة على التوافق على النموذج الرياضي التالي

$$X_{ij} = \mu + G_i + G_j + S_{ij} + \frac{1}{bc} \sum_k \sum_l e_{ijkl}$$

حيث أن: X_{ij} الطراز المظهري للأفراد μ المتوسط العام للأفراد G_i القدرة العامة على التوافق للأب I

G_j القدرة العامة على التوافق للأب J S_{ij} القدرة الخاصة على التوافق للهجين بين الأب I والأب J

e_{ijkl} الخطأ التجريبي Be عدد المكررات

الجدول (4): تحليل التباين ومجموع المربعات العائدة للقدرة العامة والخاصة والخطأ التجريبي

S. V.	Df	SS	MS	Expected Mean Squares (EMS)
Model I				
G. C. A.	P-1	Sg	Mg	$\sigma^2 + p + 2 \left(\frac{1}{p-1} \right) \sum_{gi}^2$
S. C. A.	$P(P-1)/2$	Ss	Ms	$\sigma^2 + \left(\frac{2}{p(p-1)} \right) \sum_i \sum_j s_{ij}^2$
Error	M	Se	Me'	σ^2

$$\sigma^2 E = Me' = Me/B$$

Me متوسط مربعات الخطأ التجريبي

GCA (Sg) مجموع المربعات العائدة للقدرة العامة على التوافق

SCA (Ss) مجموع المربعات العائدة للقدرة الخاصة على التوافق

نقوم بحساب متوسط المكررات الثلاثة من كل معاملة، ثم نقوم بتقدير مجموع المربعات العائدة للقدرة العامة على التوافق (S.S.)

GCA والقدرة الخاصة على التوافق (S.S. SCA).

3. تقدير تأثير القدرة الخاصة على التوافق:

(Gi) مؤثرات القدرة العامة على التوافق للآباء I (Sij) مؤثرات القدرة الخاصة على التوافق للهجن ij

مجموع المربعات العائدة للقدرة العامة والخاصة على التوافق:

$$S_g = \frac{1}{p+2} \left\{ \sum_i (X_{i.} + X_{ij})^2 - \frac{4}{p} x^2_{..} \right\}$$

$$S_s = \sum_{i \leq j} \sum_i x_{ij}^2 - \frac{1}{p+2} \sum_i (x_{i.} + x_{.i})^2 + \frac{2}{(p+1)(p+2)} x_{..}^2$$

أما تقديرات القدرة العامة (Gi) والخاصة (Sij) على التوافق ولم فتحسب من المعادلات التالية:

$$\hat{\mu} = \frac{2}{p(p+1)} x_{..}$$

$$\hat{g}_i = \frac{1}{(p+2)} \left[x_{i.} + x_{.i} - \frac{2}{p} x_{..} \right]$$

$$\hat{s}_{ij} = x_{ij} - \frac{1}{p+2} [x_{i.} + x_{.i} + x_{.j} + x_{jj}] + \frac{2}{(p+1)(p+2)} x_{..}$$

حيث أن: μ المتوسط العام P عدد الآباء x_i المجموع العائد للمنظومة الأبوية I

x_j المجموع العائد للمنظومة الأبوية J $x_{..}$ المجموع العام للأفراد x_{ij} متوسط الأفراد

يحسب الخطأ المعياري لمؤثرات القدرة على التوافق بأخذ الجذر التربيعي للتباينات

نقارن قيم القدرة العامة والخاصة على التوافق مع الصفر باختبار T للمعنوية عند درجة حرية الخطأ

$$T(G_i) = (G_i - 0) / \text{Segi}$$

$$T(S_{ij}) = (S_{ij} - 0) / \text{Sesij}$$

$$\text{GCA Var} / \text{SCA Var} = [(Mg - Me') / P + 2] / (Ms - Me')$$

4. قوة الهجين:

قدرت النسبة المئوية لقوة الهجين مقارنة بمتوسط الأب الأفضل ومتوسط الأبوين في الصفة المدروسة كما يلي:

$$H(BP) = \left[\frac{(F1 - BP)}{BP} \right] \cdot 100$$

أما النسبة المئوية لقوة الهجين مقارنة بمتوسط الأبوين فقدرت حسب المعادلة:

$$H(MP) = \left[\frac{(F1 - MP)}{MP} \right] \cdot 100$$

تم اختبار معنوية قوة الهجين باستخدام اختبار T عند مستوى معنوية 5% حسب المعادلات:

$$\text{LSD (MP)} = 0.05 T (3 \text{ Mse} / 2r)^{1/2}$$

$$\text{LSD (BP)} = 0.05 T (3 \text{ Mse} / 2r)^{1/2}$$

5. درجة التوريث ومكونات التباين الوراثي:

تعبر درجة التوريث العامة عن التباين الوراثي إلى التباين الكلي أو المظهري وفق النموذج الرياضي التالي (Burton, 1951)

:(Singh and Chaudhary, 1985

$$H^2(Bs)\% = (Vg / Vp) \times 100$$

حيث $H(Bs)$ درجة التوريث بالمعنى الواسع Vg التباين الوراثي Vp التباين المظهري (الكلي)

وتم حساب التباين الوراثي باستخدام معطيات الجدول (2) على النحو التالي:

$$Vg = (MS2 - MS3) / R$$

وحُسب التباين الكلي أو المظهري من المعادلة التالية: $Vp = (Vg + Ve) / R$

Ve تباين الخطأ التجريبي R عدد المكررات G عدد الطرز الوراثية

أما درجة التوريث بالمعنى الضيق فقد قدرت من المعادلة التالية (Warner, 1952):

$$H(Ns)\% = (Va / Vp) \times 100$$

Va التباين العائد للفعل التراكمي للمورثات.

النتائج:

1. عدد الأيام حتى الإزهار (يوم):

تعد صفة عدد الأيام حتى الإزهار من الصفات المهمة في برامج التربية، فهي تحدد مدى تأقلم النبات مع الظروف البيئية المحيطة، وتؤثر على جودة الإنتاج وموعد الحصاد. فهي تستخدم لتحسين الإنتاجية وتحديد الأصناف المبكرة أو المتأخرة. وبالتالي اختيار الأنسب للزراعة في المناطق والظروف المناخية المتنوعة (Wu et al., 2023)، حيث يظهر الجدول (5) متوسط عدد الأيام حتى الإزهار للآباء والهجن في كل من الموقعين البعلي والمروي.

تراوح عدد الأيام حتى الإزهار في الموقع البعلي بين 82.5 للطراز G5 و 87 يوماً للطراز G2، بمتوسط عام بلغ (84.21) يوماً، لوحظ أن المتوسط العام لأربعة طرز وراثية أقل من المتوسط العام وتراوح بين 83.5 و 82.5 يوم وهي على التوالي G1، G7، G3، G5، أي أنها طرز أكثر تبكيراً. أما الطرز المتبقية فقد كانت أعلى من المتوسط العام وهي على التوالي G2، G4، G6. ولدى مقارنة المتوسطات باستخدام قيمة أقل فرق معنوي ($LSD5\% = 7.92$) تبين تفوق الطراز الوراثي G5 (82.5) بالتبكير في الإزهار على معظم الطرز الوراثية باستثناء G1، G3، G7.

بلغ عدد الأيام حتى الإزهار في الموقع المروي 85 يوم للطراز G6 و 90 يوماً للطرزين G2 و G4، وبمتوسط عام بلغ (87.64) يوماً، ولوحظ أن عدد الأيام حتى الإزهار لثلاثة طرز وراثية كان أعلى من المتوسط العام وهي على التوالي G2، G4، G3، أما الطرز المتبقية فقد تراوح بين 85 و 87.5 يوم وهي على التوالي G1، G5، G7، G6. لكن تبين عدم وجود فروق معنوية بين الطرز المدروسة على مستوى 5%.

أما لدى مقارنة الهجن في الموقع البعلي تراوح عدد الأيام حتى الإزهار بين 85.5 يوماً للهجين G4×G7 (الأكثر تبكيراً) و 92 يوماً للهجين G1×G7 (الأقل تبكيراً). حيث تبين تفوق الطرز الوراثية G4×G7 و G2×G3 و G2×G5 و G6×G7، على معظم الطرز المتبقية باستثناء الطرز G1×G3، G2×G6، G2×G7، G3×G6، G1×G4، G4×G6، G5×G7. كما لوحظ أن عدد الأيام حتى الإزهار لإحدى عشرة طرازاً وراثياً كان أقل من المتوسط العام والذي بلغ (87.48) يوماً (مبكرة) وتراوح بين 87 و 85.5 يوم وهي على التوالي G1×G4، G4×G6، G5×G7، G1×G3، G2×G6، G2×G7، G3×G6، G2×G3، G2×G5، G6×G7، G4×G7. بينما كان أعلى لعشرة طرز وراثية وهي على التوالي G1×G7، G3×G7، G4×G5، G3×G4، G1×G2، G1×G5، G1×G6، G2×G4، G3×G5، G5×G6 تراوح بين 92 و 88 يوماً.

كانت مواعيد الإزهار متقاربة في الموقع المروي بين 88.5 يوماً للهجين G1×G4 و 98 يوماً للهجين G2×G5، علماً أن المتوسط العام للطرز المختبرة بلغ (92.43) يوماً، ويلاحظ أن عدد الأيام حتى الإزهار لتسعة طرز وراثية (هجن) كان أعلى من المتوسط العام وهي على التوالي G2×G5، G5×G6، G5×G7، G2×G4، G2×G3، G4×G5، G4×G6، G4×G7، G6×G7. تراوح بين 98 و 92.5 يوماً، أما الطرز المتبقية فقد تراوح بين 92 و 88.5 يوم وهي على التوالي G2×G6، G2×G7، G3×G6، G3×G7، G3×G4، G1×G7، G3×G5، G1×G2، G1×G6، G1×G3، G1×G5، G1×G4. حيث كان الطراز الوراثي G1×G4 الأكثر تبكيراً (88.5 يوماً) وتفوق على معظم الهجن باستثناء الهجينين G1×G3 و G1×G5، بينما الطراز الأقل تبكيراً (98 يوم) وتوقت عليها معظم الطرز باستثناء الطرازين G5×G6، G5×G7.

الجدول (5): عدد الأيام حتى الإزهار وحتى النضج الفيزيولوجي

عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي/ يوم				عدد الأيام حتى الازهار / يوم				الطراز الوراثي
الموقع البعلي		الموقع المروي		الموقع البعلي		الموقع المروي		
112.5	a	0.117	a	83.0	ab	87.5	a	G1
112.5	a	120.0	a	87.0	d	0.90	a	G2
113.0	a	121.0	a	83.0	ab	89.5	a	G3
115.0	a	117.5	a	86.0	cd	90.0	a	G4
112.5	a	119.5	a	82.5	a	86.0	a	G5
112.0	a	118.0	a	84.5	bc	85.0	a	G6
115.0	a	116.5	a	83.5	ab	85.5	a	G7
113.21		118.5		84.21		87.64		المتوسط العام
4.338		6.68		7.92		4.338		L.S.D 5%
113.5	abcd	118.0	bc	88.0	bcd	90.0	bc	G1 × G2
113.5	abcd	116.0	a	86.5	ab	89.5	ab	G1 × G3
112.5	ab	117.0	ab	87.0	abc	88.5	a	G1 × G4
112.5	ab	116.0	a	88.0	bcd	89.5	ab	G1 × G5
113.0	abc	117.0	ab	88.0	bcd	90.0	bc	G1 × G6
114.5	bcdef	120.0	def	92.0	e	91.0	cd	G1 × G7
116.0	efg	120.5	efg	86.0	a	94.0	gh	G2 × G3
115.0	cdefg	121.0	fg	88.0	bcd	94.5	h	G2 × G4
115.5	defg	122.0	gh	86.0	a	98.0	i	G2 × G5
117.0	g	116.0	a	86.5	ab	92.0	def	G2 × G6
116.5	fg	119.0	cde	86.5	ab	92.0	def	G2 × G7
111.5	a	117.5	abc	88.5	cd	91.5	de	G3 × G4
113.0	abc	119.0	cde	88.0	bcd	91.0	cd	G3 × G5
112.5	ab	118.0	bc	86.5	ab	92.0	def	G3 × G6
115.5	defg	119.0	cde	89.0	d	92.0	def	G3 × G7
114.5	bcdef	120.5	efg	89.0	d	93.0	fg	G4 × G5
116.5	fg	120.0	def	87.0	abc	93.0	fg	G4 × G6
115.5	defg	122.0	gh	85.5	a	92.5	ef	G4 × G7
117.0	g	123.0	h	88.0	bcd	97.5	i	G5 × G6
115.0	cdefg	118.5	bcd	87.0	abc	97.0	i	G5 × G7
114.0	bcde	118.0	bc	86.0	a	92.5	ef	G6 × G7
114.5		118.95		87.48		92.43		المتوسط العام
2.489		1.616		1.7		1.468		L.S.D 5%

2. قوة الهجين:

يهدف البحث في هاتين الصفتين، وهما عدد الأيام حتى الإزهار وعدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي، إلى تقليل مدة الدورة الحياتية للنبات، وذلك من خلال خفض قيمة الصفة المدروسة. وبما أن الهدف هو تقليل الفترة الزمنية، فإن القيم السلبية لكل من قوة الهجين والقدرة على التوافق تُعد مؤشراً مرغوباً، إذ تعكس قدرة التراكيب الوراثية على إنتاج نباتات تصل إلى مرحلة الإزهار والنضج الفيزيولوجي في وقت أقصر مقارنةً بالأباء أو المتوسط العام للسلالة.

أظهرت نتائج قوة الهجين في الجدول 6، قيمة سالبة ولكنها غير معنوية بالنسبة للأب الأفضل في الموقع البعلي للمجموعات الهجينة

G2×G3 و G2×G5 (-1.15) لكل منهما و (-0.58) للهجين G4×G7، و G2×G6 و G2×G7 (-0.57) أيضاً لكل منهما، في حين أظهر هجين واحد قيمة سالبة غير معنوية في الموقع المروي وهي G1×G4 (-1.67) مشيرة إلى أن المورثات المتحركة بتوريث الصفة تظهر أثر السيادة الفائقة، بينما لم تظهر قوة الهجين لدى الهجينين G1×G2 و G1×G3، في حين كانت بقية الهجن في كلا الموقعين ذات قيم موجبة غير مرغوبة. وبالنسبة لمتوسط الأبوين كانت جميع الهجن في الموقع البعلي ذات قيم موجبة وهي غير مرغوبة، بينما أظهرت مجموعة واحدة في الموقع المروي قيمة سالبة غير معنوية وهي G1×G4 (-0.28) مشيرة إلى أن المورثات المتحركة بتوريث الصفة تظهر أثر المورثات ذات الأثر التراكمي.

الجدول (6): قوة الهجين لصفة عدد الأيام حتى الإزهار مقارنة بمتوسط الأبوين والأب الأفضل

الموقع المروي				الموقع البعلي				الطرز الوراثي
T BP	BP	T MP	MP	T BP	BP	T MP	MP	
0.00	0	1.32	1.41	1.13	1.15	3.92	3.53 **	G1 × G2
0.00	0	1.05	1.13	3.96	4.22 **	4.58	4.22 **	G1 × G3
-1.37	-1.67	-0.26	-0.28	1.13	1.16	3.27	2.96 **	G1 × G4
1.82	2.29	2.90	3.17 **	5.66	6.02 **	6.87	6.34 **	G1 × G5
2.28	2.86 *	3.95	4.35 **	3.96	4.14 **	5.56	5.07 **	G1 × G6
3.19	4 **	4.74	5.2 **	9.63	10.18 **	11.44	10.51 **	G1 × G7
3.65	4.44 **	4.47	4.74 **	-1.13	-1.15	1.31	1.18	G2 × G3
4.10	5 **	4.74	5 **	1.13	1.15	1.96	1.73	G2 × G4
7.29	8.89 **	10.53	11.36 **	-1.13	-1.15	1.63	1.47	G2 × G5
1.82	2.22	4.74	5.14 **	-0.57	-0.57	0.98	0.87	G2 × G6
1.82	2.22	4.47	4.84 **	-0.57	-0.57	1.63	1.47	G2 × G7
1.37	1.67	1.84	1.95	2.83	2.91 **	5.23	4.73 **	G3 × G4
1.37	1.68	3.42	3.7 **	5.66	6.02 **	6.87	6.34 **	G3 × G5
2.28	2.79 *	5.00	5.44 **	2.26	2.37 *	3.60	3.28 **	G3 × G6
2.28	2.79 *	4.74	5.14 **	6.23	6.59 **	7.52	6.91 **	G3 × G7
2.74	3.33 *	5.26	5.68 **	3.40	3.49 **	6.21	5.64 **	G4 × G5
2.74	3.33 *	5.79	6.29 **	1.13	1.16	2.29	2.05 **	G4 × G6
2.28	2.78 *	5.00	5.41 **	-0.57	-0.58	0.98	0.88	G4 × G7
10.48	13.37 **	12.63	14.04 **	3.96	4.14 **	5.88	5.39 **	G5 × G6
10.03	12.79 **	11.84	13.12 **	3.96	4.19 **	5.23	4.82 **	G5 × G7
6.38	8.19 **	7.63	8.5 **	1.70	1.78	2.62	2.38 **	G6 × G7
		2.0518	T calculated 5%			2.0518	T calculated 5%	

MP قوة الهجين لمتوسط الأبوين، BP قوة الهجين للأب الأفضل، T MP المحسوبة لمتوسط الأبوين، T BP المحسوبة للأب الأفضل

3. القدرة العامة على التوافق:

أظهرت نتائج القدرة العامة على التوافق في الموقع البعلي أن أفضل الطرز الأبوية كان الطراز G3 حيث كانت القيمة لديه سالبة (-0.310) وهذا يشير إلى أن هذا الطراز يملك العدد الأكبر من المورثات ذات الأثر التراكمي والمسؤولة عن تقليل عدد الأيام حتى الإزهار. كما أظهرت طرز أخرى قيماً سالبة وهي G5 (-0.254) و G6 (-0.254) و G7 (-0.03)، بينما كانت بقية الطرز ذات قيم موجبة غير مرغوبة. في حين كانت تأثيرات القدرة العامة في الموقع المروي سالبة وعالية المعنوية للطرز (G1 (-1.818**)) وهذا يشير إلى أن هذا الطراز يملك العدد الأكبر من المورثات ذات الأثر التراكمي التي تساهم في تقليل عدد الأيام اللازمة للإزهار، وأظهرت ثلاثة طرز وراثية قيماً سالبة (G6 (-0.318)، G7 (-0.21)، G3 (-0.095)، أما بقية الطرز كانت ذات قيم موجبة غير مرغوبة الجدول (7).

4. القدرة الخاصة على التوافق:

في الموقع البعلي كانت نتائج القدرة الخاصة على التوافق سالبة وغير معنوية للهجين $G6 \times G7$ (-0.375) وهو هجين ناتج من أبوين سالبا القدرة العامة على التوافق وبالتالي التفاعل الوراثي من النمط (تراكمي $\times$ تراكمي) وهو هجين مبشر من المتوقع ثبات الصفة، وأظهر الهجين $G1 \times G4$ (-0.319) قيمة سالبة غير معنوية وهو ناتج من أبوين موجبا القدرة العامة على التوافق وبالتالي التفاعل الوراثي من النمط (لا تراكمي $\times$ لا تراكمي)، بينما كانت ستة هجن ذات قيم سالبة وغير معنوية نتجت من أبوين أحدهما عالي القدرة على التوافق والآخر منخفض القدرة أي التفاعل الوراثي من النمط (تراكمي $\times$ لا تراكمي) وبالتالي من المتوقع حدوث انعزالات وراثية في الأجيال اللاحقة، بينما باقي الهجن كانت ذات قيم موجبة وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفة.

أما في الموقع المروي فقد أظهرت الهجن $G2 \times G5$ (4.681**), $G5 \times G6$ (5.681**), $G5 \times G7$ (5.069**) قيماً موجبة وعالية المعنوية وهي غير مرغوبة لأنها مسؤولة عن زيادة عدد الأيام اللازمة حتى الإزهار، بينما كانت ستة هجن ذات قيم سالبة غير معنوية $G1 \times G4$ (-1.264), $G3 \times G5$ (-1.042), $G1 \times G5$ (-0.819), $G1 \times G2$ (-0.597), $G2 \times G7$ (-0.208), $G2 \times G6$ (-0.097) وهي هجن نتجت من أبوين أحدهما مرتفع القدرة العامة على التوافق والآخر منخفض القدرة العامة وبالتالي التفاعل الوراثي من النمط (لا تراكمي $\times$ تراكمي) ومن المتوقع حدوث انعزالات وراثية في الأجيال اللاحقة. أما بقية الهجن فكانت ذات قيم موجبة معنوية أو غير معنوية لتأثيرات القدرة الخاصة وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفة (الجدول 7).

الجدول (7): تأثيرات القدرة العامة والخاصة لصفة عدد الأيام حتى الإزهار

الموقع البعلي							
تأثيرات القدرة الخاصة على الخلط للهجين						تأثير القدرة العامة على الخلط للأباء	
G6	G5	G4	G3	G2	G1		
						0.246	G1
					0.903	0.191	G2
				-0.542	-0.097	-0.310	G3
			1.736	0.736	-0.319	0.413	G4
		2.181	1.903	-0.597	1.347	-0.254	G5
	1.847	0.181	0.403	-0.097	1.347	-0.254	G6
-0.375	0.625	-1.542	2.681	-0.319	5.125	-0.03	G7
الهجن						آباء	
1.15						0.40	LSD5%
الموقع المروي							
						-1.818**	G1
					-0.597	1.182**	G2
				1.681*	0.181	-0.095	G3
			0.014	1.736*	-1.264	0.349	G4
		0.514	-1.042	4.681**	-0.819	0.905**	G5
	5.681**	1.736*	1.181	-0.097	0.903	-0.318	G6
1.792*	5.069**	1.125	1.069	-0.208	1.792*	-0.21	G7
الهجن						آباء	
1.43						0.49	LSD5%

5. مكونات التباين:

تشير قيمة مكونات التباين العائدة للقدرة العامة على التوافق على مكونات التباين العائدة للقدرة الخاصة على التوافق GCA/SCA

(0.01) في الموقع البعلي و(0.09) في الموقع المروي إلى زيادة أهمية المورثات التي تظهر أثر المورثات السائدة والمتفوقة. وكانت درجة التوريث العامة عالية في كلا الموقعين (85.73) و(90.24) وهي تشير إلى أهمية التباين الوراثي في توريث هذه الصفة، بينما درجة التوريث الخاصة كانت منخفضة في كلا الموقعين وبلغت (1.62) و(8.46) الجدول (8)، وتشير إلى ضعف مساهمة الأثر التراكمي للمورثات في توريث هذه الصفة مقارنة مع المورثات السائدة أو المتفوقة، وبالتالي لا ينصح بممارسة الانتخاب بالاعتماد على الشكل المظهر، وتعتبر الطريقة المثلى لتحسين هذه الصفة هي طريقة التهجين.

الجدول (8): مكونات التباين الوراثي لصفة عدد الأيام حتى الازهار وحتى النضج الفيزيولوجي

مكونات التباين	عدد الأيام حتى الازهار		عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي	
	الموقع البعلي	الموقع المروي	الموقع البعلي	الموقع المروي
Grand mean	86.66	91.23	114.18	118.84
component GCA	0.04	0.90	0.31	0.47
component SCA	4.92	10.45	1.51	2.82
GCA/SCA	0.01	0.09	0.20	0.17
تباين بيئي	0.78	1.20	1.76	1.38
تباين نمط وراثي	4.69	11.13	3.55	4.51
تباين نمط مظهري	5.47	12.33	5.31	5.89
انحراف النمط المظهري	2.34	3.51	2.30	2.43
BSH	85.73	90.24	66.89	76.52
NSH	1.62	8.46	8.28	9.96
GA	4.13	6.53	3.17	3.83
%GA	4.77	7.16	2.78	3.22

6. عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي (يوم):

تُعد صفة عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي من الصفات الفينولوجية المهمة، إذ تُعبر عن الفترة الزمنية اللازمة لوصول البذور إلى أقصى وزن جاف لها واكتمال تراكم المادة الجافة فيها، وتوقف عملية امتصاص العناصر الغذائية من النبات الأم. وتُعتبر هذه المرحلة النقطة الفاصلة التي يبدأ بعدها المحصول في فقدان الرطوبة والوزن، وهي تحدد طول دورة حياة الصنف بشكل دقيق. وتتأثر هذه الصفة بالعوامل الوراثية (تباين الأصناف بين مبكر ومتأخر) والعوامل البيئية، وفي مقدمتها درجة الحرارة وطول النهار، مما يجعلها معياراً أساسياً في برامج التربية لاختيار الأصناف المتكيفة مع طول الموسم الزراعي في كل منطقة. لذلك يبدو من خلال الجدول 5 أن عدد الأيام حتى النضج في الموقع البعلي تراوح بين 112 يوماً للطراز G6 و 115 يوماً للطرازين G4 و G7، وكانت الفروق بين الطرز الوراثية المدروسة غير معنوية عند مستوى ($p < 0.05$)، ويلاحظ أن عدد الأيام حتى النضج للطراز G1، G2، G5، G6 تراوحت بين 112 و 113 يوماً وهي أقل من المتوسط العام (113.21) يوماً، ولطرازين وراثيين كانت أعلى من المتوسط العام حيث كان 115 يوماً وهما G4، G7. تراوح عدد الأيام حتى النضج في الموقع المروي بين 116 يوماً لكل من الطرز G2×G6، G1×G3، G1×G5 و 123 يوم للطراز G5 × G6.

أما في الموقع المروي فقد تراوح متوسط عدد الأيام حتى النضج بين 116.5 يوم للطراز G7 و 121 يوماً للطراز G3، وكانت الفروق بين الطرز الوراثية المدروسة غير معنوية عند مستوى ($p < 0.05$). علماً أن المتوسط العام للطرز المختبرة بلغ (118.5) يوماً، ويلاحظ أن عدد الأيام حتى النضج لأربعة طرز وراثية أقل من المتوسط العام (مبكرة) وتراوحت بين 116.5 و 118 يوماً وهي على التوالي G6، G4، G1، G7. أما الطرز الثلاثة المتبقية كانت متأخرة تراوحت بين 119.5 و 121 يوماً وهي على التوالي

G5, G2, G3.

أما لدى مقارنة متوسطات عدد الأيام حتى النضج للطرز الهجينة المختبرة في الموقع البعلي فقد تراوح بين 111.5 يوماً للهجين G3×G4 و 117 يوم للهجينين G2×G6 و G5×G6، وتبين تفوق الطراز G3×G4 على معظم الطرز الهجينة باستثناء G1×G4، G1×G5، G3×G6، G1×G6، G3×G5، G1×G2، G1×G3، G3×G4. علماً أن المتوسط العام للطرز المختبرة بلغ (114.5) يوماً، لوحظ أن عدد الأيام حتى النضج لتسعة طرز وراثية أقل من المتوسط العام وتراوحت بين 111.5 و 114 يوماً وهي G1×G2، G1×G3، G1×G6، G3×G5، G1×G4، G1×G5، G3×G6، G3×G4. أما الطرز المتبقية كانت أعلى أو تساوي المتوسط العام وهي على التوالي G2×G6، G2×G3، G4×G6، G2×G7، G5×G6، G2×G5، G3×G7، G4×G7، G2×G4، G5×G7، G1×G7، G4×G5 وتراوحت بين 117 و 114.5 يوماً، الجدول (5).

بينما في الموقع المروي تبين تفوق كل من G1×G3، G1×G5، G2×G6 على معظم الهجن المدروسة وعدم وجود فروق معنوية بينها. علماً أن المتوسط العام للطرز المختبرة بلغ (118.95) يوماً، ويلاحظ أن عدد الأيام حتى النضج لعشرة طرز وراثية أقل من المتوسط العام (مبكرة) وتراوحت بين 118.5 و 116 يوماً وهي على التوالي G5×G7، G1×G2، G3×G6، G6×G7، G3×G4، G1×G4، G1×G6، G1×G3، G1×G5، G2×G6. أما الطرز الإحدى عشر المتبقية كانت أعلى من المتوسط العام وهي على التوالي G5×G6، G2×G5، G4×G7، G2×G4، G2×G3، G4×G5، G1×G7، G4×G6، G2×G7، G3×G5، G3×G7 تراوحت بين 123 و 119 يوماً.

7. قوة الهجين:

بينت النتائج وجود اختلافات بين الطرز المدروسة حيث أظهر هجينان قيمة سالبة بناءً على متوسط الأبوين في الموقع البعلي، حيث كانت سالبة وعالية المعنوية للهجين ($G3 \times G4$ (-2.19**)) وغير معنوية للهجين ($G1 \times G4$ (-1.1))، بينما أظهرت تسعة هجن قيمة سالبة في الموقع المروي حيث تراوح انحراف متوسط هجن الجيل الأول بين (-2.52^{**}) لكلا الهجينين $G1 \times G3$ و $G2 \times G6$ وأقل قيمة سالبة غير معنوية ($G1 \times G4$ (-0.21)) مشيرة إلى أن المورثات المتحكممة بتوريث الصفة تظهر أثر المورثات ذات الأثر التراكمي، كما تبين غياب قوة الهجين لدى $G1 \times G5$ و $G3 \times G6$ في الموقع البعلي، و $G2 \times G3$ في الموقع المروي، أما بقية الهجن فكانت ذات قيم موجبة غير مرغوبة. أما بالنسبة لقوة الهجين المحسوبة بناءً على الأب الأفضل فقد أظهرت ستة هجن مزروعة بعلياً قيمة سالبة، حيث تراوح انحراف متوسط الجيل الأول بين أعلى قيمة سالبة ومعنوية ($G3 \times G4$ (-3.04*)) مشيرة إلى أن المورثات المتحكممة بتوريث الصفة تظهر أثر السيادة الفائقة وأقل قيمة سالبة وغير معنوية (-0.43) لدى الهجينين $G1 \times G7$ و $G4 \times G5$ ، ولوحظ غياب قوة الهجين لدى كل $G1 \times G5$ و $G2 \times G4$ و $G3 \times G5$ و $G5 \times G7$ ، في حين أظهرت ثلاثة عشر هجيناً مزروعة مروباً قيمة سالبة وتراوحت بين أعلى قيمة سالبة وعالية المعنوية ($G1 \times G3$ (-4.13**)) مشيرة إلى أن المورثات المتحكممة بتوريث الصفة تظهر أثر السيادة الفائقة، وأقل قيمة سالبة غير معنوية (-0.41) لدى الهجين $G2 \times G3$ ، ولوحظ غياب قوة الهجين لدى $G6 \times G7$ ، بينما كانت باقي المجموعات الهجينة ذات قيم موجبة وهي غير مرغوبة الجدول (9).

الجدول (9): قوة الهجين لصفة عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي مقارنة بمتوسط الأبوين والأب الأفضل.

الموقع المروي				الموقع البعلي				الطرز الوراثي
T BP	BP	T MP	MP	T BP	BP	T MP	MP	
-1.70	-1.67	-0.49	-0.42	0.75	0.89	0.87	0.89	G1 × G2
-4.25	-4.13 **	-2.95	-2.52 **	0.38	0.44	0.65	0.67	G1 × G3
-0.43	-0.43	-0.25	-0.21	-1.89	-2.17	-1.09	-1.1	G1 × G4
-2.98	-2.93 **	-2.21	-1.9 **	0.00	0	0.00	0	G1 × G5

-0.85	-0.85	-0.49	-0.43	0.38	0.44	0.65	0.67	G1 × G6
2.55	2.56 *	3.19	2.78 **	-0.38	-0.43	0.65	0.66	G1 × G7
-0.43	-0.41	0.00	0	2.26	2.65 *	2.83	2.88 **	G2 × G3
0.85	0.83	2.21	1.89 **	0.00	0	1.09	1.1	G2 × G4
1.70	1.67	2.21	1.88 **	2.26	2.67 *	2.61	2.67 **	G2 × G5
-3.40	-3.33 **	-2.95	-2.52 **	3.40	4 **	4.14	4.23 **	G2 × G6
-0.85	-0.83	0.74	0.63	1.13	1.3	2.40	2.42 **	G2 × G7
-2.98	-2.89 **	-1.72	-1.47	-2.64	-3.04 *	-2.18	-2.19 **	G3 × G4
-1.70	-1.65	-1.23	-1.04	0.00	0	0.22	0.22	G3 × G5
-2.55	-2.48 *	-1.47	-1.26	-0.38	-0.44	0.00	0	G3 × G6
-1.70	-1.65	0.25	0.21	0.38	0.43	1.31	1.32	G3 × G7
0.85	0.84	1.96	1.69	-0.38	-0.43	0.65	0.66	G4 × G5
1.70	1.69	2.21	1.91 **	1.13	1.3	2.61	2.64 **	G4 × G6
3.83	3.83 **	4.91	4.27 **	0.38	0.43	0.44	0.43	G4 × G7
2.98	2.93 **	4.17	3.58 **	3.40	4 **	4.14	4.23 **	G5 × G6
-0.85	-0.84	0.49	0.42	0.00	0	1.09	1.1	G5 × G7
0.00	0	0.74	0.64	-0.75	-0.87	0.44	0.44	G6 × G7
		2.0518	T calculated 5%			2.0518	T calculated 5%	

MP قوة الهجين لمتوسط الأبوين، BP قوة الهجين للأب أفضل، T MP المحسوبة لمتوسط الأبوين، T BP المحسوبة للأب أفضل

8. القدرة العامة على التوافق:

أشارت النتائج في الجدول 10 إلى أن أفضل الطرز الأبوية كان الطراز G1 في كلا الموقعين حيث كانت تأثيرات القدرة العامة على التوافق لديه سالبة وعالية المعنوية (**-0.992) في الموقع البعلي و(**-1.413) في الموقع المروي، وهذا يشير إلى أن هذا الطراز يملك العدد الأكبر من المورثات ذات الأثر التراكمي التي تساهم في تقليل عدد الأيام حتى النضج. كما كانت تأثيرات القدرة العامة على التوافق سالبة ومعنوية للطراز G3 (**-0.603) وسالبة غير معنوية للطراز G5 (-0.103) في الموقع البعلي، بينما كانت باقي الطرز ذات قيم موجبة معنوية وغير معنوية لا يمكن استخدامها في برامج التربية لتحسين هذه الصفة لأنها تحتوي العدد الأكبر من المورثات السائدة أو المتفوقة المسؤولة عن زيادة عدد الأيام حتى النضج. كما أظهر الطرازان G6 و G7 قيمة سالبة وغير معنوية في الموقع المروي. أما الطراز G5 فكانت تأثيرات القدرة العامة لديه موجبة وعالية المعنوية (**-0.809) وهو غير مرغوب، وباقي الطرز ذات قيم موجبة معنوية وغير معنوية لذلك لا يمكن استخدامها في برامج التربية كونها تحتوي العدد الأكبر من المورثات السائدة أو المتفوقة المسؤولة عن زيادة عدد الأيام حتى النضج.

9. القدرة الخاصة على التوافق:

أظهرت عدة هجن في الموقع البعلي قيمة سالبة، وكانت سالبة ومعنوية (**-2.306) للهجين G3×G4 وهو ناتج من أبوين أحدهما منخفض القدرة العامة على التوافق والآخر مرتفع القدرة، وأن التفاعل الوراثي في هذه الحالة من النمط الوراثي (تراكمي × لا تراكمي)، وسالبة غير معنوية ناتجة من أبوين أحدهما منخفض القدرة العامة على التوافق والآخر مرتفع القدرة والتفاعل الوراثي من النمط الوراثي (تراكمي × لا تراكمي) لأربعة هجن وهي G1×G2، G1×G4، G1×G6، G3×G6، والهجين G6×G7 ذو قيمة سالبة غير معنوية (-1.083) ناتج من أبوين كلاهما موجب القدرة العامة على التوافق والتفاعل الوراثي من النمط (لا تراكمي × لا تراكمي)، ومن المتوقع حدوث انعزالات وراثية في الأجيال اللاحقة لتلك المجموعات. وكان الهجينين G1×G5 (-0.583) و G3×G5 (-0.472) ذو قيمة سالبة غير معنوية ناتجة من أبوين كلاهما منخفض القدرة العامة على التوافق وهما هجينان مبشران والتفاعل الوراثي من النمط (تراكمي × تراكمي)، ومن المتوقع توريث الصفة وثباتها بعد عدد قليل من دورات الانتخاب للأجيال اللاحقة. في حين كانت بقية الهجن ذات قيم موجبة غير مرغوبة لتحسين هذه الصفة.

في الموقع المروي أظهرت اثنتا عشر هجيناً قيماً سالبة، وكان الهجينين $G1 \times G5$ و $G2 \times G6$ ذوا قيم سالبة وعالية المعنوية وهي ناتجة من أبوين أحدهما مرتفع القدرة العامة على التوافق والآخر منخفض وبالتالي التفاعل الوراثي من النمط الوراثي (تراكمي $\times$ لا تراكمي) فمن المتوقع حدوث انحرافات وراثية في الأجيال اللاحقة. والهجين $G3 \times G4$ ذا قيمة سالبة ومعنوية ناتجة عن أبوين كلاهما موجب القدرة العامة على التوافق وبالتالي التفاعل الوراثي من النمط (لا تراكمي $\times$ لا تراكمي)، وتعتبر مجموعة غير مبشرة. في حين كان الهجينين $G1 \times G6$ (-0.125) و $G6 \times G7$ (-0.403) ناتجان من أبوين مرتفعاً القدرة العامة على التوافق، وهما مجموعتان مبشرتان ينصح بمتابعة العمل عليهما والتفاعل الوراثي من النمط (تراكمي $\times$ تراكمي)، في حين كانت بقية الهجن ذات قيم سالبة غير معنوية أو موجبة وهي غير مهمة لتحسين هذه الصفة. الجدول (10).

الجدول (10): يبين تأثيرات القدرة العامة والخاصة لصفة عدد الأيام حتى النضج الفيزيولوجي

الموقع البعلبي							
تأثيرات القدرة الخاصة على الخلط للهجن						تأثير القدرة العامة على الخلط للأباء	
G6	G5	G4	G3	G2	G1		
						-0.992**	G1
					-0.250	0.564	G2
				1.861*	0.917	-0.603*	G3
			-2.306*	0.028	-0.917	0.230	G4
		0.194	-0.472	0.861	-0.583	-0.103	G5
	2.861**	2.028*	-1.139	2.194*	-0.250	0.064	G6
-1.083	0.083	0.250	1.083	0.917	0.472	0.84**	G7
الهجن						آباء	
1.73						0.59	LSD5%
الموقع المروي							
						-1.413**	G1
					-0.069	0.643*	G2
				0.875	-1.569*	0.143	G3
			-1.736*	1.264	-0.681	0.254	G4
		0.597	-0.792	1.708*	-2.236**	0.809**	G5
	3.653**	1.208	-0.681	-3.181**	-0.125	-0.302	G6
-0.403	-1.014	3.042**	0.153	-0.347	2.708**	-0.13	G7
الهجن						آباء	
1.53						0.53	LSD5%

10. مكونات التباين:

بلغت قيمة مكونات التباين العائدة للقدرة العامة على التوافق على القدرة الخاصة على التوافق GCA/SCA في الموقع البعلبي (0.20) وفي الموقع المروي (0.17) وهذا يشير إلى أهمية المورثات التي تظهر أثر المورثات السائدة والمتفوقة. وكانت قيمة درجة التوريث العامة مرتفعة في كلا الموقعين وبلغت (66.89) في الموقع البعلبي و(79.52) في الموقع المروي وهي تشير على أهمية التباين الوراثي في توريث هذه الصفة، بينما كانت درجة التوريث الخاصة منخفضة في كلا الموقعين وبلغت في الموقع البعلبي (8.28) وفي الموقع المروي (9.96) الجدول (8)، وهي تشير إلى قلة مساهمة الأثر التراكمي للمورثات في توريث هذه الصفة بالمقارنة مع المورثات السائدة أو المتفوقة وبالتالي لا ينصح بممارسة الانتخاب بالاعتماد على الشكل المظهري، وتعتبر طريقة التهجين هي الطريقة المثلى لتحسين هذه الصفة.

الاستنتاجات:

1. نستنتج مما سبق أن الهجين $G4 \times G7$ الأكثر تكبيراً بينما الهجين $G1 \times G7$ كان الأكثر تأخيراً بالنسبة لصفة عدد الأيام حتى الإزهار. وبالنسبة لصفة التكبير في النضج الفيزيولوجي فقد كان الهجين $G3 \times G4$ الأكثر تكبيراً بينما الهجينين $G2 \times G6$ و $G5 \times G6$ متأخرين في النضج.
2. لوحظ تفوق كل من الهجينين $G2 \times G3$ و $G2 \times G5$ لصفة عدد الأيام حتى الإزهار، والهجين $G3 \times G4$ لصفة عدد الأيام حتى النضج وذلك على متوسط الأب الأفضل في الموقع البعلي.
3. لوحظ امتلاك الطراز الأبوي $G1$ قدرة عامة عالية على التوافق في الموقع المروي بالنسبة لصفة عدد الأيام حتى الإزهار، وفي كلا الموقعين بالنسبة لصفة عدد الأيام حتى النضج.
4. لوحظ امتلاك الهجين $G6 \times G7$ قدرة خاصة عالية على التوافق لصفة عدد الأيام حتى الإزهار في الموقع البعلي، وفي صفة عدد الأيام حتى النضج امتلك قدرة خاصة عالية على التوافق كل من الهجينين $G1 \times G5$ و $G3 \times G5$ في الموقع البعلي والهجين $G1 \times G6$ في الموقع المروي.

التوصيات:

1. التركيز على الطرز الوراثية المبكرة في الإزهار وهي الهجين $G1 \times G4$ وفي النضج الهجين $G3 \times G4$.
2. متابعة العمل على الطرز الأبوية المتحملة للجفاف والتي تميزت بقدرة عامة عالية على التوافق وهي $G1$ لصفة عدد الأيام حتى الإزهار و $G1$ و $G3$ لصفة عدد الأيام حتى النضج.
3. كما يجب متابعة العمل على الهجن التي تفوقت على متوسط الأب الأفضل في ظروف الجفاف وهي $G2 \times G3$ و $G2 \times G5$ لصفة التكبير في الإزهار، و $G3 \times G4$ لصفة التكبير في النضج. كما تميز الهجين $G6 \times G7$ لصفة التكبير في الإزهار، والهجن $G1 \times G5$ و $G3 \times G5$ لصفة التكبير في النضج بقدرة خاصة عالية على التوافق وهي مجموعات مبشرة.

المراجع:

- القصير، حنين. (2019) تقييم بعض سلالات البازلاء العلفية ودراسة مؤشرات الجفاف لها. رسالة ماجستير، كلية الهندسة الزراعية، جامعة حلب، ص: 16-36.
- Ahmadi, J., Vaezi, B. and Pour-Aboughadareh, A. (2015). Assessment of Heritability and Relationships among Agronomic characters in Grasspea (*Lathyrus sativus* L.) under rainfed conditions. *Biharean Biologist* 9: 29-34.
- Burton, G. W. (1951). Quantitative inheritance in Pearl millet (*Pennisetum Glaucum*). *Agron. J.* 46, 409-417.
- Campbell, C. G., (1997). Grass pea: *Lathyrus sativus* L. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome; Italy, 92p.
- Dejene Girma and Lijalem Korbu, (2012). Genetic improvement of grasspea (*Lathyrus sativus*) in Ethiopia: an unfulfilled promise. *Plant Breeding*, 131: 231-236.
- Dikshit, N., Nizar, M.A. and Sivaraj, N. (2014). Phenotypic variability in grasspea (*Lathyrus ativus* L.) germplasm of Vidarbha region of Maharashtra, India. *Legume Research* 37: 556-558.
- Grela, E.R., Rybinski, W., Klebaniuk, R. and Matras, J. (2010). Morphological characteristics of some accessions of grass pea (*Lathyrus sativus* L.) grown in Europe and nutritional traits of their seeds. *Genetic Resources and Crop Evolution* 57: 693-701.

- Griffing, B., (1956). Concept of general and specific combining ability in relation to diallel system. Aust. J. Bio. Sci. 9:463-493.
- Hillocks, R.J. and Maruthi, M.N. (2012). Grass pea (*Lathyrus sativus*): Is there a case for further crop improvement? Euphytica 186: 647-654. <https://www.bighaat.com/blogs/kb/forage-crops-and-its-importance-in-agriculture>.
- Khawaja, I. ; H.I.T. Khawaja, I. Ullah, N.U. Raja, A.M. Khushk, (1993). Lathyrism in Pakistan: a preliminary survey. H.K.M. Yusuf, F. Lambein (Eds.), *Lathyrus sativus* and Human Lathyrism: Progress and Prospects: Proceedings of the Second International Colloquium on Lathyrus/Lathyrism, December 10–12, Dhaka, University of Dhaka, Dhaka (1995), pp. 55-62.
- Lazányi, J., (2000). Grass pea and green manure effects in the Great Hungarian Plain. Univ. West. Aust., Centre Leg. Med. Agric., Lathyr. Lathyrism Newsletter, 1
- Nasri, M., Zahedi, H., Tohidi Moghadam, H.R., Ghooshchi. F. and Paknejad. F. (2008). Investigation of water stress on macroelements in Canola genotypes leaf (*Brassica napus*). American Journal of Agricultural and Biological Sciences., 3(4): 669-672.
- Parihar, A.K., Dixit, G.P. and Singh, D. (2015). Genetic Variability Analysis for Quantitative Traits in a Germplasm set of Grasspea (*Lathyrus* spp.). Legume Research 38: 461-464.
- Polignano, G.B., Uggenti, P., Olita, G., Bisignano, V., Alba, V. and Perrino, P. (2005). Characterization of grasspea (*Lathyrus sativus* L.) entries by means of agronomically useful traits. Lathyrus Lathyrism Newsletter 4: 10-14.
- Rahman, S., Molla, M.R., Nazim-ud-Dowla, M.A.N., Rasul, M.G. and Mian, M.A.K. (2010). Assessment of Genetic Diversity in Grasspea (*Lathyrus sativus* L.) Genotypes using Morphological Markers. Academic Journal of Plant Sciences 3: 85-91.
- Singh, P. and Narayanan, S.S. (1997). Biometrical Techniques in Plant Breeding. Kalyani Publishers. New Delhi, India.
- Singh, R.K. and B.D. Chaudhary., (1985). Biometrical methods in quantitative genetic analysis. Rev. (Ed). Kalyani Publishers, Ludhiana, India. P.P. 318.
- Talukdar, D. and Biswas, A.K. (2008). Variability, Heritability and Scope of Selection for some Quantitative Traits in Induced Mutant Lines of Grasspea (*Lathyrus sativus* L.). International Journal of Plant Sciences 3: 528-530.
- Turk, M., Albayrak, S. and Celik, N. (2007). Estimates of Broad-sense Heritability for Seed yield and Yield Components of Grasspea (*Lathyrus sativus* L.). Turkey Journal of Agriculture and Forestry 31: 155-158.
- Vaz Patto, M.C., Skiba, B., Pang, E.C.K., Ochatt, S.J., Lambein. F. and Rubiales. D. (2006). Lathyrus improvement for resistance against biotic and abiotic stresses: From classical reeding to marker assisted selection. Euphytica., 147: 133–147.
- Warner, J. N. (1952). A method for estimating heritability. Agron. J. 44,427-430.
- Wu, L., Marcelis, L. F. M., Kong, F., & Zhu, Y. (2023). Editorial: Flowering time control in agricultural and horticultural crops, volume II. Frontiers in Plant Science, 14, 1183355.
- Wuletaw, T. and Endashaw, B. (2002). Variation and Association Analysis in Grasspea (*Lathyrus sativus* L.). SINET: Ethiopian Journal Sciences 25: 191-204.
- Wuletaw, T. and Endashaw, B. (2003). Variation and association of morphological and biochemical characters in grass pea (*Lathyrus sativus* L.). Euphytica 130: 315-324.

Study of the Genetic Behavior of Some Phenological Traits of Grass Pea Hybrids

Hanin Alkasser^{1*}, Mohammad Jamal Hamandoush¹, Ahmad Shams Alden Shaaban¹ and Abdullah Alyoussef²

¹ Department of Field Crops, Faculty of Agricultural Engineering, Aleppo University, Aleppo, Syria.

² Aleppo Research Center, General Commission for Agricultural Scientific Research, Syria.

(*Corresponding author: Hanin Alkasser, Email: haninalkaseer92@gmail.com)



Received: 23/01 /2026

Accepted: 2/ 08/ 2026

Abstract

The study was conducted during the 2020–2024 seasons at the Hamimah (Aleppo) and Al-Karim (Salamiyah) stations, affiliated with the General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), across two sites: rainfed and irrigated. A randomized complete block design (RCBD) with three replications was used to evaluate heterosis, general combining ability (GCA), and specific combining ability (SCA) for phenological traits in grass pea (*Lathyrus sativus*). The plant material included seven parental lines and 21 hybrids resulting from a half-diallel crossing. At the rainfed site: The hybrid G4×G7 was the earliest (85.5 days), while the hybrids G2×G3 and G2×G5 exhibited negative heterosis (−1.15) for days to flowering, based on the better-parent (BP) heterosis. The parent G3 was distinguished by a high positive GCA for earliness of flowering, whereas the hybrid G6×G7 recorded a high SCA. For days to physiological maturity, the hybrid G3×G4 was the earliest maturing (111.5 days) and showed significant negative heterosis. The parent G1 exhibited a high GCA, and the hybrids G1×G5 and G3×G5 displayed high SCA, with an expectation of trait stability in subsequent generations. At the irrigated site: The hybrid G1×G4 was the earliest (88.5 days) and was the only hybrid that recorded a negative heterosis value for days to flowering, with parent G1 exhibiting a high GCA but no promising hybrids identified. For days to physiological maturity, the three hybrids G1×G3, G1×G5, and G2×G6 were the earliest (116 days). The hybrid G1×G3 showed negative heterosis based on both better-parent (BP) and mid-parent (MP) values, while G2×G6 showed negative heterosis based on mid-parent only. Parent G1 possessed a high GCA, and the hybrid G1×G6 exhibited a high SCA, with an expectation of trait stability in future generations.

Keywords: hybrid vigor, general combining ability, specific combining ability, genotypes, hybrid, grass pea.